

TENT COOPERATION TRE

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

IMAMURA, Masazumi
8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg.
8-7, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 22 June 2001 (22.06.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference A01369M	
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)

1. The following indications appeared on record concerning:

☐ the applicant ☐ the inventor ☒ the agent ☐ the common representative

Name and Address

1) IMAMURA, Masazumi
2) SHIOZAWA, Hisao
3) KAMATA, Junji
5th Floor, KRF Bldg.
5-5, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku, Tokyo 104-0031
Japan

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

03-3271-1331

Facsimile No.

03-3271-1410

Teleprinter No.

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address

8th Floor, Kyobashi Nisshoku Bldg.
8-7, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
Japan

State of Nationality

State of Residence

Telephone No.

03-3538-5680

Facsimile No.

03-3538-5686

Teleprinter No.

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office ☐ the designated Offices concerned
☐ the International Searching Authority ☒ the elected Offices concerned
☐ the International Preliminary Examining Authority ☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Masashi HONDA Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

TENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
in its capacity as elected Office

Date of mailing: 08 March 2001 (08.03.01)	
International application No.: PCT/JP00/05920	Applicant's or agent's file reference: A01369M
International filing date: 31 August 2000 (31.08.00)	Priority date: 31 August 1999 (31.08.99)
Applicant: YANAGAWA, Hiroshi et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:
31 August 2000 (31.08.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

PTO/PCT Rec'd 27 FEB 2002

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

IMAMURA, Masazumi
KRF Bldg., 5th Floor
5-5, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 22 September 2000 (22.09.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference A01369M	International application No. PCT/JP00/05920

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION (for all designated States except US)
YANAGAWA, Hiroshi et al (for US)

International filing date : 31 August 2000 (31.08.00)
Priority date(s) claimed : 31 August 1999 (31.08.99)
Date of receipt of the record copy
by the International Bureau : 18 September 2000 (18.09.00)

List of designated Offices :

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE
National : JP, US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

- ☒ time limits for entry into the national phase
☒ confirmation of precautionary designations
☐ requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer: Masashi HONDA Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	---

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT
PTO/PCT Rec'd 27 FEB 2002NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

IMAMURA, Masazumi
KRF Bldg., 5th Floor
5-5, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 22 September 2000 (22.09.00)	
Applicant's or agent's file reference A01369M	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)
Applicant MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION et al	

- The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document, within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

<u>Priority date</u>	<u>Priority application No.</u>	<u>Country or regional Office or PCT receiving Office</u>	<u>Date of receipt of priority document</u>
31 Augu 1999 (31.08.99)	11/244704	JP	18 Sept 2000 (18.09.00)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Masashi HONDA

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PATENT COOPERATION TREATY

PCT


From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

To:

IMAMURA, Masazumi
KRF Bldg., 5th Floor
5-5, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 08 March 2001 (08.03.01)		
Applicant's or agent's file/reference A01369M		
IMPORTANT NOTICE		
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)	Priority date (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)
Applicant MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION et al		

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice:

US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 08 March 2001 (08.03.01) under No. WO 01/16600

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer J. Zahra Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	---

PATENT COOPERATION TREATY

PCT


INFORMATION CONCERNING ELECTED
OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

IMAMURA, Masazumi
KRF Bldg., 5th Floor
5-5, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON



Date of mailing (day/month/year) 08 March 2001 (08.03.01)		
Applicant's or agent's file reference A01369M		IMPORTANT INFORMATION
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)	
		Priority date (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)
Applicant MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION et al		

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

EP : AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE
National : JP, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:


None

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" **before the expiration of 30 months from the priority date** before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed **until 31 months from the priority date** for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer: J. Zahra Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	--



PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL
OF COPIES OF TRANSLATION
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT

PCT REC'D 27 FEB 2002

(PCT Rule 72.2)

To:

MAMURA, Masazumi
6th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg.
8-7, Kyobashi 1-chome
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
JAPON

Date of mailing (day/month/year) 06 December 2001 (06.12.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference A01369M	
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)
Applicant MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION et al	

1. Transmittal of the translation to the applicant.

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the International Bureau of the international preliminary examination report established by the International Preliminary Examining Authority.

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices.

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following elected Offices requiring such translation:

EP,US

The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

JP

3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary examination report.

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 740.14.35	Authorized officer Eliott PERETTI Telephone No. (41-22) 338.83.38
--	---

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際予備審査機関）

出願人代理人

今村 正純

あて名

〒 104-0031

東京都中央区京橋1丁目5番5号

KRFビル5階

特許事務所サイクス

PTO/PCT Rec'd 27 FEB 2002

PCT見解書

(法第13条)
[PCT規則66]

発送日

(日.月.年)

05.12.00

出願人又は代理人
の書類記号

A01369M

応答期間

上記発送日から 2 月/年以内

国際出願番号

PCT/JPO0/05920

国際出願日

(日.月.年)

31.08.00

優先日

(日.月.年)

31.08.99

国際特許分類 (IPC) Int. Cl¹ G01N33/566, 33/532, C12N15/09,
C07K17/00, 1/13, C12Q1/00, 1/68

出願人 (氏名又は名称)

三菱化学株式会社

1. これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。
2. この見解書は、次の内容を含む。
- I ☒ 見解の基礎
 - II ☐ 優先権
 - III ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
 - IV ☐ 発明の単一性の欠如
 - V ☒ 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - VI ☐ ある種の引用文献
 - VII ☐ 国際出願の不備
 - VIII ☐ 国際出願に対する意見
3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。
- いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条 (PCT規則66.2(d)) に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。
- どのように? 法第13条 (PCT規則66.3) の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び言語については、法施行規則第62条 (PCT規則66.8及び66.9) を参照すること。
- なお 補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2 (PCT規則66.4) を参照すること。補正書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。審査官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。
- 応答がないときは、国際予備審査報告は、この見解書に基づき作成される。
4. 国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により 31.12.01 である。

名称及びあて先

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

亀田 宏之

2J

9015

電話番号 03-3581-1101 内線 3252

I. 見解の基礎

1. この見解書は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この見解書において「出願時」とする。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき見解書を作成した。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この見解書は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)

請求の範囲 1~40 有
請求の範囲 無

進歩性 (IS)

請求の範囲 有
請求の範囲 1~40 無

産業上の利用可能性 (IA)

請求の範囲 有
請求の範囲 1~40 無

2. 文献及び説明

文献1: 柳川弘志 「第20回日本分子生物学会年会 プログラム・講演要旨集」
1997年 第546頁 3-501-P-505

文献2: JP, 2-10159, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシャフト
・ミット・ベシュレンクレル・hafツング)
12. 1月. 1990 (12. 01. 90)
& EP, 331126, A

文献3: JP, 3-103765, A (東洋紡績株式会社)
30. 4月. 1991 (30. 04. 91)

文献4: JP, 10-248599, A (理化学研究所)
22. 9月. 1998 (22. 09. 98)

文献5: JP, 11-94747, A (日立ソフトウェアエンジニアリング株式会
社) 9. 4月. 1999 (09. 04. 99)

文献6: JP, 8-188540, A (西川武二)
23. 7月. 1996 (23. 07. 96)

請求の範囲1~18、33~37

文献1には、ピューロマイシンとフルオレスセインとを結合したフルオレスセイ
ンピューロマイシンを合成し、蛍光ラベル化試薬として、タンパク質のC末端にラ
ベル化したものが記載されている。

文献2, 3には、蛍光ラベルタンパク質と標的分子の相互作用に基づいて発せら
れる信号の変化を検出することによりタンパク質-分子間の相互作用の解析を行う
免疫蛍光偏光法が記載されており、該方法に文献1記載のC末端ラベル化タンパク
を用いることは当業者にとって自明である。

また、タンパク質の同定やスクリーニングに用いることも自明である。

補充欄（いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること）

第 V 欄の続き

請求の範囲 19～23

文献1には、ピュロマイシンとフルオレスセインとを結合したフルオレスセインピュロマイシンを合成し、タンパク質のC末端のラベル化用蛍光ラベル化試薬としたもの記載されている。

文献6には、蛋白質のC末端に結合させるタグ抗原試薬が記載されている。

請求の範囲 24～29

文献6には、尋常性天疱瘡抗原蛋白のC末端にタグ抗原が結合されたものを固相に結合した固定化蛋白が記載されている。（請求項6等参照）

請求の範囲 30～32

文献4, 5にはプロテインチップが記載されており、文献6に記載されているような蛋白を複数し用いた、プロテインチップ、チップ作成の装置、解析装置は当業者にとって自明である。

請求の範囲 38

該請求の範囲の記載では、例えば抗原や抗体等すべてのタンパク質が含まれる。

請求の範囲 39, 40

文献1にC末端ラベル化蛋白質が記載されている。

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference A01369M	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/05920	International filing date (day/month/year) 31 August 2000 (31.08.00)	Priority date (day/month/year) 31 August 1999 (31.08.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G01N 33/566, 33/532, C12N 15/09, C07K 17/00, 1/13, C12Q 1/00, 1/68		
Applicant MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 31 August 2000 (31.08.00)	Date of completion of this report 21 February 2001 (21.02.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/05920

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 00/05920

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-40	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-40	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-40	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Document 1: Hiroshi Yanagawa, "Program and Abstracts of the 20th Annual Meeting in 1997 of the Molecular Biology Society of Japan," p. 546, 3-501-P-505

Document 2: JP, 2-10159, A (Boehringer Mannheim GmbH), 12 January 1990 (12.01.90), also EP, 331126, A

Document 3: JP, 3-103765, A (Toyobo Co., Ltd.), 30 April 1991 (30.04.91)

Document 4: JP, 10-248599, A (RIKEN), 22 September 1998 (22.09.98)

Document 5: JP, 11-94747, A (Hitachi Software Engineering Co., Ltd.), 9 April 1999 (09.04.99)

Document 6: JP, 8-188540, A (Takeji Nishikawa), 23 July 1996 (23.07.96)

Claims 1-18 and 33-37

Document 1 discloses the synthesis of fluorescein puromycin by binding puromycin and fluorescein and use thereof as a fluorescently labeled reagent in labeling the C-end of a protein.

Documents 2 and 3 disclose an immunofluorescent polarization method wherein the mutual interaction between a protein and a molecule is analyzed by detecting a change in the signal generated by the mutual interaction between

a fluorescently labeled protein and a target molecule. Application of said method to the C-end labeled protein disclosed in Document 1 would be obvious to a person skilled in the art.

Furthermore, use for protein identification or screening would also be obvious.

Claims 19 to 23

Document 1 discloses the synthesis of fluorescein puromycin by binding puromycin and fluorescein and use thereof as a fluorescent labeling reagent for protein C-end labeling.

Document 6 discloses a tagging antigen reagent for binding to the C-end of a protein.

Claims 24 to 29

Document 6 discloses an immobilized protein to which a pemphigus vulgaris antigen protein with a tag antigen bound to its C-end has been solid-phase bound.

Claims 30 to 32

Documents 4 and 5 disclose a protein chip, and the use of multiple proteins such as those disclosed in Document 6 in protein chips, a device to prepare protein chips, and an analysis device would all be obvious to a person skilled in the art.

Claim 38

All proteins such as antigens and antibodies are included in the description of said claim.

Claims 39 and 40

Document 1 discloses a C-end labeled protein.

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

REC'D 09 MAR 2001

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 A01369M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/05920	国際出願日 (日.月.年) 31.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99
国際特許分類(IPC) Int. Cl ⁷ G01N33/566, 33/532, C12N15/09, C07K17/00, 1/13, C12Q1/00, 1/68		
出願人(氏名又は名称) 三菱化学株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。 <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で _____ ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 31.08.00	国際予備審査報告を作成した日 21.02.01	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 亀田宏之 電話番号 03-3581-1101 内線 3252	2J 9015

様式PCT/IPEA/409(表紙)(1998年7月)

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT 14条)の規定に基づく命令に
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 PCT 19条の規定に基づき補正されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲

1~40

有

請求の範囲

無

進歩性(IS)

請求の範囲

1~40

有

請求の範囲

無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲

1~40

有

請求の範囲

無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: 柳川弘志 「第20回日本分子生物学会年会 プログラム・講演要旨集」
1997年 第546頁 3-501-P-505

文献2: JP, 2-10159, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシャフト
・ミット・ベシュレンクレル・ハフツング)
12. 1月. 1990 (12. 01. 90)
&EP, 331126, A

文献3: JP, 3-103765, A (東洋紡績株式会社)
30. 4月. 1991 (30. 04. 91)

文献4: JP, 10-248599, A (理化学研究所)
22. 9月. 1998 (22. 09. 98)

文献5: JP, 11-94747, A (日立ソフトウェアエンジニアリング株式会
社) 9. 4月. 1999 (09. 04. 99)

文献6: JP, 8-188540, A (西川武二)
23. 7月. 1996 (23. 07. 96)

請求の範囲1~18、33~37

文献1には、ピューロマイシンとフルオレスセインとを結合したフルオレスセイン
ピューロマイシンを合成し、蛍光ラベル化試薬として、タンパク質のC末端にラベル
化したものが記載されている。

文献2、3には、蛍光ラベルタンパク質と標的分子の相互作用に基づいて発せられ
る信号の変化を検出することによりタンパク質-分子間の相互作用の解析を行う免疫
蛍光偏光法が記載されており、該方法に文献1記載のC末端ラベル化タンパクを用い
ることは当業者にとって自明である。

また、タンパク質の同定やスクリーニングに用いることも自明である。

請求の範囲19~23

文献1には、ピューロマイシンとフルオレスセインとを結合したフルオレスセイン
ピューロマイシンを合成し、タンパク質のC末端のラベル化用蛍光ラベル化試薬とし
たもの記載されている。

文献6には、蛋白質のC末端に結合させるタグ抗原試薬が記載されている。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

請求の範囲 24～29

文献6には、尋常性天疱瘡抗原蛋白のC末端にタグ抗原が結合されたものを固相に結合した固定化蛋白が記載されている。(請求項6等参照)

請求の範囲 30～32

文献4, 5にはプロテインチップが記載されており、文献6に記載されているような蛋白を複数し用いた、プロテインチップ、チップ作成の装置、解析装置は当業者にとって自明である。

請求の範囲 38

該請求の範囲の記載では、例えば抗原や抗体等すべてのタンパク質が含まれる。

請求の範囲 39, 40

文献1にC末端ラベル化蛋白質が記載されている。

PRO-CT Rec'd 27 FEB 2002



1/5

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2000年08月31日（31.08.2000）木曜日 09時53分30秒

A01369M

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号.	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/R0/101 この特許協力条約に基づく国際 出願願書は、 0-4-1 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91 (updated 01.07.2000)
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ とを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理 官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	A01369M
I	発明の名称	タンパク質-分子間相互作用解析法
II	出願人	出願人である (applicant only)
II-1	この欄に記載した者は	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-2	右の指定国についての出願人で ある。	
II-4ja	名称	三菱化学株式会社
II-4en	Name	MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION
II-5ja	あて名:	100-0005 日本国 東京都 千代田区 丸の内二丁目5番2号
II-5en	Address:	5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP
II-7	住所 (国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	03-3283-6977
II-9	ファクシミリ番号	03-3283-6984
II-10	電子メール	BISICH J24901



特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出願用) - 印刷日時 2000年08月31日 (31.08.2000) 木曜日 09時53分30秒

A01369M

III-1	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)	
III-1-1	この欄に記載した者は		
III-1-2	右の指定国についての出願人である。		
III-1-4ja	氏名(姓名)		
III-1-4en	Name (LAST, First)		
III-1-5ja	あて名:		
III-1-5en	Address:		柳川 弘志 YANAGAWA, Hiroshi 243-0303 日本国 神奈川県 愛甲郡愛川町 中津 7 4 5 7 7457 Nakatsu Aikawa-machi, Aiko-gun, Kanagawa 243-0303 Japan
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP	
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP	
III-2	その他の出願人又は発明者	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)	
III-2-1	この欄に記載した者は		
III-2-2	右の指定国についての出願人である。		
III-2-4ja	氏名(姓名)		
III-2-4en	Name (LAST, First)		
III-2-5ja	あて名:		
III-2-5en	Address:		根本 直人 NEMOTO, Naoto 194-0041 日本国 東京都 町田市 玉川学園 4 - 2 0 - 2 8 - 2 0 1 4-20-28-201, Tamagawagakuen Machida-shi, Tokyo 194-0041 Japan
III-2-6	国籍(国名)	日本国 JP	
III-2-7	住所(国名)	日本国 JP	
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく出願人のために行動する。	代理人 (agent)	
IV-1-1ja	氏名(姓名)		
IV-1-1en	Name (LAST, First)		
IV-1-2ja	あて名:		
IV-1-2en	Address:		今村 正純 IMAMURA, Masazumi 104-0031 日本国 東京都 中央区 京橋一丁目5番5号 K R Fビル5階 5th Floor, KRF Bldg., 5-5, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan
IV-1-3	電話番号		03-3271-1331
IV-1-4	ファクシミリ番号		03-3271-1410
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as first named agent)	
IV-2-1ja	氏名		
IV-2-1en	Name(s)		塩澤 寿夫; 釜田 淳爾 SHIOZAWA, Hisao; KAMATA, Junji

特許協力条約に基づく国際出願願書

A01369M

原本（出願用） - 印刷日時 2000年08月31日（31.08.2000）木曜日 09時53分30秒

V	国の指定		
V-1	広域特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	EP: AT BE CH&LI CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国	
V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には括弧内に記載する。)	JP US	
V-5	指定の確認の宣言 出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての国の指定を行う。ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。		
V-6	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張		
VI-1-1	先の出願日	1999年08月31日 (31.08.1999)	
VI-1-2	先の出願番号	特願平11-244704	
VI-1-3	国名	日本国 JP	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VIII-1	願書	5	-
VIII-2	明細書（配列表を除く）	38	-
VIII-3	請求の範囲	6	-
VIII-4	要約	1	a01369m.txt
VIII-5	図面	6	-
VIII-6	明細書の配列表	6	-
VIII-7	合計	62	

特許協力条約に基づく国際出願願書

A01369M

原本（出願用） - 印刷日時 2000年08月31日（31.08.2000）木曜日 09時53分30秒

	添付書類	添付	添付された電子データ
VIII-8	手数料計算用紙	✓	-
VIII-9	別個の記名押印された委任状	✓	-
VIII-12	優先権証明書	優先権証明書 VI-1	-
VIII-15	計算機読取可能な媒体によるマルチメディア及び/又はアミノ酸配列リスト		別個のフレキシブルディスク
VIII-16	PCT-EASYディスク	-	フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面	-
VIII-17	その他	国際事務局の口座への振込みを証明する書面	-
VIII-17	その他	陳述書	-
VIII-17	その他	フレキシブルディスクの記録形式等の情報を記載した書面	-
VIII-18	要約書とともに提示する図の番号		
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	
IX-1	提出者の記名押印		
IX-1-1	氏名(姓名)	今村 正純	
IX-2	提出者の記名押印		
IX-2-1	氏名(姓名)	塩澤 寿夫	
IX-3	提出者の記名押印		
IX-3-1	氏名(姓名)	釜田 淳爾	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面:	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であつてその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP

特許協力条約に基づく国際出願願書

原本（出願用） - 印刷日時 2000年08月31日（31.08.2000）木曜日 09時53分30秒

A01369M

10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	
------	----------------------------------	--

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

PCT手数料計算用紙(願書付属書)

原本(出願用) - 印刷日時 2000年08月31日 (31.08.2000) 木曜日 09時53分30秒

A01369M

[この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない]

0	受理官庁記入欄			
0-1	国際出願番号.			
0-2	受理官庁の日付印			
0-4	様式-PCT/RO/101 (付属書)			
0-4-1	このPCT手数料計算用紙は、 右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91 (updated 01.07.2000)		
0-9	出願人又は代理人の書類記号	A01369M		
2	出願人	三菱化学株式会社		
12	所定の手数料の計算	金額/係数	小計 (JPY)	
12-1	送付手数料 T	⇒	18,000	
12-2	調査手数料 S	⇒	72,000	
12-3	国際手数料			
	基本手数料 (最初の30枚まで) b1	40,700		
12-4	30枚を越える用紙の枚数	32		
12-5	用紙1枚の手数料 (X)	940		
12-6	合計の手数料 b2	30,080		
12-7	b1 + b2 = B	70,780		
12-8	指定手数料			
	国際出願に含まれる指定国 数	3		
12-9	支払うべき指定手数料の数 (上限は8)	3		
12-10	1指定当たりの手数料 (X)	8,800		
12-11	合計の指定手数料 D	26,400		
12-12	PCT-EASYによる料金の 減額 R	-12,500		
12-13	国際手数料の合計 (B+D-R) I	⇒	84,680	
12-17	納付するべき手数料の合計 (T+S+I+P)	⇒	174,680	
12-19	支払方法	送付手数料: 特許印紙 調査手数料: 特許印紙 国際手数料: 銀行口座への振込み 優先権証明書請求手数料: 特許印紙		

EASYによるチェック結果と出願人による言及

13-1-1	出願人による言及 氏名(名称)	9 6 2 1 弁理士 今村正純
13-1-2	出願人による言及 氏名(名称)	9 2 6 3 弁理士 塩澤寿夫
13-1-3	出願人による言及 氏名(名称)	9 5 8 4 弁理士 釜田淳爾

13-2-2	EASYによるチェック結果 指定国	Green? より多くの指定が可能です。(以下の国が指定からはずされています: AP:(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW); EA:(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM); OA:(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG); AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, LI, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW) 確認してください。
13-2-6	EASYによるチェック結果 内訳	Green? 要約書とともに提示する図の番号が示されていません。
13-2-9	EASYによるチェック結果 注釈	Green? 願書に表示しなければならない通常の項目はすべて他のPCT-EASYの機能で入力することができます。言及を用いた表示の有効性について確認してください。
13-2-10	EASYによるチェック結果 受理官庁/国際事務局記入欄	Green? この願書を作成したPCT-EASYは英語版ないし西欧言語版以外のWindows上で動作しています。ASCII文字以外の文字について、願書と電子データを注意して比較してください。

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 3 月 8 日 (08.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 01/16600 A1

(51) 国際特許分類: G01N 33/566, 33/532, C12N 15/09, C07K 17/00, 1/13, C12Q 1/00, 1/68

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱化学株式会社 (MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05920

(22) 国際出願日: 2000 年 8 月 31 日 (31.08.2000)

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 柳川弘志 (YANAGAWA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津7457 Kanagawa (JP). 根本直人 (NEMOTO, Naoto) [JP/JP]; 〒194-0041 東京都町田市玉川学園4-20-28-201 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願平11/244704 1999年8月31日 (31.08.1999) JP


(74) 代理人: 今村正純, 外(IMAMURA, Masazumi et al.); 〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目5番5号 KRFビル5階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): JP, US.

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF ANALYZING MUTUAL INTERACTION BETWEEN PROTEIN AND MOLECULE

(54) 発明の名称: タンパク質-分子間相互作用解析法



a...SUBSTRATE
b...LIGHT
c...STREPTAVIDIN-BONDED ALKALINE PHOSPHATASE
d...PROTEIN 2
e...BIOTIN
f...PROTEIN 1
g...STREPTAVIDIN

(57) Abstract: A method of analyzing a mutual interaction between a protein and a molecule involving the following steps: (1) the step of bringing a C-end labeled protein into contact with a target molecule; and (2) the step of detecting a change in a signal generated due to the mutual interaction between the C-end labeled protein and the target molecule, in the signal generated from the C-end labeled protein or the target molecule; and a method of identifying a molecule mutually interacting with a protein or a protein mutually interacting with a molecule involving the following steps: (1) the step of labeling the C-end of a protein to prepare a C-end labeled protein; (2) the step of bringing the C-end labeled protein into contact with a target molecule; and (3) the step of judging that the protein undergoes a mutual interaction with the target molecule, in case where a change in a signal, which is generated from the C-end labeled protein or the target molecule, caused by the contact of the C-end labeled protein with the target molecule is detected.

BEST AVAILABLE COPY

[続葉有]



(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

BEST AVAILABLE COPY

(57) 要約:

タンパク質—分子間相互作用の解析方法であって、下記の工程:(1)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程;及び(2)該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号において、該C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づいて発せられる信号の変化を検出する工程を含む方法、並びにタンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、下記の工程:(1)タンパク質のC末端をラベル化してC末端ラベル化タンパク質を製造する工程;(2)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程;及び(3)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じる該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には該タンパク質と該標的分子が相互作用すると判定する工程を含む方法。

明 細 書

タンパク質-分子間相互作用解析法

Rec'd PCT/PTO 27 FEB 2002

技術分野

本発明は、C末端がラベル化されたタンパク質と相互作用する分子を同定する方法に関する。本発明により、現在急速に蓄積されている遺伝子の塩基配列がコードするタンパク質の機能解析、例えばタンパク質-タンパク質相互作用、タンパク質-核酸相互作用、タンパク質-低分子化合物相互作用等の解析を迅速化するための手段が提供される。また、本発明はタンパク質の機能解析において不可欠である大量のデータを迅速に解析する方法（ハイスループット化）において有力な手段を提供する。

背景技術

分子生物学の進歩により、個々の遺伝子産物の解析が容易となった結果、生命現象を分子レベルで解析することが可能となった。例えば、タンパク質-タンパク質相互作用やタンパク質-核酸相互作用等の解析による生化学的機能解析を通して、遺伝子産物であるタンパク質の機能が解析される。

タンパク質-タンパク質相互作用の解析法としては、イーストツーハイブリッド (yeast two hybrid) 法 (Chien, C. T., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88, 9578-9582 (1991))、ファージディスプレイ法 (Smith, G.P., Science, 228, pp.1315-1317 (1985))、GST-融合タンパク質プルダウン法、免疫共沈法等が知られている。GST-融合タンパク質プルダウン法、及び免疫共沈法では、試験管内で反応が行われるのに対し、イーストツーハイブリッド法では、細胞内の相互作用が検出される。

タンパク質-核酸相互作用の解析法としては、電気泳動移動度シフトアッセイ (electrophoresis mobility shift assay) 法 (Revzin, A., et al., Anal. Biochem.,

153, 172 (1986))、DNase I フットプリント法 (Calas, D., et al., Nucleic Acids Res., 5, 3157 (1978))、メチル化緩衝法等が知られている。電気泳動シフトアッセイ法では、目的の核酸配列を有する断片を放射線同位元素等で標識してプローブとし、これとタンパク質ライブラリーを接触させ、次いでポリアクリルアミドゲル電気泳動で検出する。タンパク質-核酸相互作用が存在すると、プローブの元の移動度と異なるバンドが検出される。この方法によれば、タンパク質が認識し結合する核酸配列、及びタンパク質内のDNA結合ドメイン等を解析できる。

一方、遺伝子産物であるタンパク質を直接ラベルし、相互作用を検定する方法も知られている。この方法は、ラベル化されたタンパク質から発せられる信号が、該タンパク質が他分子との相互作用することにより変化することを用いて解析するため、上記した方法と比し、感度、正確性において優れた方法である。

タンパク質の直接ラベル化方法としては、無細胞翻訳系や生細胞で遺伝子を発現させる際、基質となるアミノ酸を ^{35}S 、 ^3H 、 ^{14}C 等の放射能性同位元素でラベルしたものをを用いることによりタンパク質に取り込ませる放射能ラベル化法が一般的である。しかし、この場合放射能を利用するため安全管理上、特別な施設等が必要とされる。

放射性化合物を利用しない方法としてはラベル化 tRNA を用いる方法が知られている。この方法によれば、まず、アミノ酸のリジンの ϵ -アミノ基にビオチン等のラベル物質を共有結合させ、これをリジン等のアンチコドンをもつ tRNA にエステル結合させたもの (ビオチン-リジン-tRNA) を合成し、無細胞翻訳系に投入し、翻訳産物であるタンパク質をビオチン化する。この方法により作成されたタンパク質は、電気泳動後、メンブレンに移し、アルカリフォスファターゼとストレプトアビジンとの融合タンパク質によって化学発光させる。これを、X線フィルム等を使って、翻訳産物を同定する (Promega 社、(1993) Technical Bulletin, No.182, p.2)。この方法は、合成したビオチン-リジン-tRNA が極めて不安定 (-70°C で6カ月) であり、高価であるという欠点を有する。さら

に、翻訳されたタンパク質は、複数のリジン側鎖がビオチンで修飾され、しかも、その修飾される側鎖は各分子ごとに異なるため、同一の遺伝子から翻訳されたにも関わらず、機能及び構造が本来のものとは異なる複数の翻訳産物が得られる。そのため、タンパク質の機能解析を極めて難しいものにする。

また、タンパク質のアミノ酸の NH_2 、 SH 、 OH 基に、直接、化学的に蛍光物質を結合させる方法が複数知られている（PanVera 社、(1998) Fluorescence Polarization Applications Guide Chapter 7）。しかし、これらの方法はどれもタンパク質を変性させる条件下で化学結合させるため、タンパク質の構造及び機能を著しく変化させる可能性が高い。しかも、蛍光物質がタンパク質の側鎖に部位特異的に結合することなく、複数の側鎖に非特異的に結合するため、本来のものとは構造及び機能が異なるタンパク質が複数存在することになり、タンパク質の機能解析において正確な情報が得られない。さらに、この化学修飾法においては、目的のタンパク質の精製操作が不可欠である。

本発明者等は、ビューロマイシン等の核酸誘導体を用いて翻訳系中でタンパク質のC末端にラベル物質を直接結合させる方法を先に提案している（特願平10-133170号明細書, 特願平10-320093号明細書）。この方法により、構造及び機能を損なうことなくタンパク質をラベル化することが可能となった。しかし、この方法においてもC末端へのラベル分子の結合の効率に問題があった。

上記した公知のタンパク質のラベル化法には、これと相互作用する分子を同定する方法に用いるためには、ラベル化されたタンパク質が構造及び機能を保持できない、安全性に欠ける、ラベル化の効率が悪い等の問題点があった。また迅速に分子間相互作用を解析する方法として蛍光偏光解消法、表面プラズモン共鳴法等の手段が存在するにも関わらず、これを有効に利用するための技術については満足 of いくものが得られていない。

発明の要約

そこで、本発明者等はC末端ラベル化タンパク質を用いてタンパク質と相互作

用する分子を同定する方法を確立すべく鋭意検討した。その結果、C末端ラベル化タンパク質、C末端にスペーサーを介してラベル化物質が結合してなるタンパク質を固相化した固相化C末端ラベル化タンパク質、及びラベル化分子等を用いれば、タンパク質と相互作用する分子を効率的に同定し得ることを見いだした。本発明はこれらの知見に基づいて完成されたものである。

すなわち、本発明によれば、

1. タンパク質-分子間相互作用の解析方法であって、下記の工程：

(1) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(2) 該C末端ラベル化タンパク質又は標的分子が発する信号において、該C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づいて発せられる信号の変化を検出する工程

を含む方法；

2. 標的分子がタンパク質、核酸、糖鎖、又は低分子化合物である上記1に記載の方法；

3. 標的分子が標識物質によりラベル化されているラベル化分子である上記1又は2に記載の方法；

4. 標識物質が蛍光標識試薬である上記3に記載の方法；

5. C末端ラベル化タンパク質が、標識物質を含むラベル部とタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物を含むアクセプター部とを含むラベル化試薬の存在下で、該タンパク質のコーディング領域を含む核酸を転写及び／又は翻訳系で発現させてタンパク質合成を行わせることにより調製されたものである上記1ないし4のいずれかに記載の方法；

6. アクセプター部がピューロマイシン、3'-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌクレオシド、3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドの化学構造骨格を含む化合物又はそれらの類縁体を含む上記5に記載の方法；

7. ラベル化試薬がラベル部とアクセプター部とがスペーサーを介して結合している化合物を含む上記5又は6に記載の方法；

8. C末端ラベル化タンパク質又は標的分子のいずれか一方が固相に結合している上記1ないし7のいずれかに記載の方法、及び上記方法において、固相への結合の様相が下記のa又はb:

a: 該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子のいずれか一方が基盤に1種類ずつ番地付けされて固定化されている; 又は

b: 該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子のいずれか一方が複数の穴を有するマイクロプレートの各穴底面に1種類ずつ固定化されている

のいずれかである方法;

9. C末端ラベル化タンパク質が、該タンパク質を構成するラベル部又はラベル部以外の部分により固相に結合している上記8に記載の方法;

10. C末端ラベル化タンパク質を構成するラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子を含み、該分子が固相表面に結合している特定のポリペプチドとの連結を介して固相に結合する上記9に記載の方法;

11. 特定のポリペプチドとそれに特異的に結合する能力を有する分子の組み合わせが、ビオチン結合タンパク質/ビオチン、マルトース結合タンパク質/マルトース、Gタンパク質/グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド/金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ/グルタチオン、DNA結合タンパク質/DNA、抗体/抗原分子、カルモジュリン/カルモジュリン結合ペプチド、ATP結合タンパク質/ATP、及びエストラジオール受容体タンパク質/エストラジオールよりなる群から選ばれるいずれかの組み合わせである上記10項に記載の方法;

12. 信号の変化の測定を表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、固相酵素免疫検定法、蛍光偏光解消法、及び蛍光相関分光法よりなる群から選択される1以上の方法により行う上記1ないし11のいずれかに記載の方法;

13. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部により固相に結合されており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化され

たラベル化分子であり、信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素免疫検定法よりなる群から選択される 1 以上の方法により行われる上記 1、2、5 ないし 11 のいずれかに記載の方法；

14. ラベル化分子が蛍光標識試薬によりラベル化された標的分子である上記 13 に記載の方法；

15. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部以外の部分により固相に結合されており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化されたラベル分子であり、信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素免疫検定法よりなる群から選択される 1 以上の方法により行われる上記 1、2、5 ないし 11 のいずれかに記載の方法；

16. ラベル化分子が蛍光標識試薬によりラベル化された標的分子である上記 15 に記載の方法；

17. 標的分子が固相に結合されており、C末端ラベル化タンパク質のラベル部より発せられる信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素免疫検定法よりなる群から選択される 1 以上の方法により行われる上記 1、2、5 ないし 11 のいずれかに記載の方法；

18. C末端ラベル化タンパク質及び標的分子が固相に結合されずに溶液中に存在しており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化されたラベル化分子であり、信号の変化の測定が蛍光偏光解消法及び／又は蛍光相関分光法により行われる、上記 1、2、5 ないし 11 のいずれかに記載の方法；

19. ラベル部とアクセプター部とを含むタンパク質のラベル化試薬であって、該ラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子であり、該アクセプター部がタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物であるタンパク質のラベル化試薬。

20. ラベル部がスパーサーを介してアクセプター部に共有結合している上記19項に記載の試薬；
21. スパーサーがポリエチレン又はポリエチレングリコールのいずれかである上記19又は20に記載の試薬；
22. ラベル部がビオチン、マルトース、グアニンヌクレオチド、金属イオン、グルタチオン、タンパク質結合性DNA、抗原分子、カルモジュリン結合ペプチド、ATP、及びエストラジオールよりなる群より選ばれる1以上の分子を含む上記19ないし21のいずれかに記載の試薬；
23. アクセプター部がビューロマイシン、3'-N-アミノアシルビューロマイシンアミノヌクレオシド、又は3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドのいずれかの化学構造骨格を含む化合物又はそれらの類縁体を含む上記19ないし22のいずれかに記載の試薬；
24. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部により固相に結合していることを特徴とする固定化タンパク質；
25. C末端ラベル化タンパク質が、標識物質よりなるラベル部とタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物よりなるアクセプター部とから構成されるラベル化試薬の存在下で、該タンパク質のコーディング領域を含む核酸を転写及び／又は翻訳系で発現させてタンパク質合成を行わせることにより調製されたものである上記24に記載の固定化タンパク質；
26. ラベル化試薬のラベル部がスパーサーを介してアクセプター部に共有結合している上記24又は25に記載の固定化タンパク質；
27. ラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子であり、該分子が固相に結合された特定のポリペプチドと結合する上記24ないし26のいずれかに記載の固定化タンパク質；
28. アクセプター部がビューロマイシン、3'-N-アミノアシルビューロマイシンアミノヌクレオシド、又は3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドのいずれかの化学構造骨格を有する化合物又はその類縁体を含む上記24ないし

28のいずれかに記載の固定化タンパク質；

29. ラベル部を構成する特定の分子と該分子と特異的に結合する能力を有する分子の組み合わせが、ビオチン結合タンパク質／ビオチン、マルトース結合タンパク質／マルトース、Gタンパク質／グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド／金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ／グルタチオン、DNA結合タンパク質／DNA、抗体／抗原分子、カルモジュリン／カルモジュリン結合ペプチド、ATP結合タンパク質／ATP、及びエストラジオール受容体タンパク質／エストラジオールよりなる群より選ばれるいずれかの組み合わせである上記24ないし28のいずれかに記載のタンパク質；

30. 上記24ないし29のいずれかに記載の固定化タンパク質の集合体を含むプロテインチップ；

31. アダプタータンパク質が表面に結合した基盤を保持する手段、該基盤にC末端ラベル化タンパク質を導入する手段、及び該基盤を洗浄する手段を有する上記30に記載のプロテインチップを作成するための装置；

32. チップを保持する手段、該チップに標的分子を接着させる手段、該チップを洗浄する手段、及び該C末端ラベル化タンパク質からの信号を測定し、該C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づく信号の変化を検出するための手段を有する、上記10、11、13、又は14のいずれかに記載の方法において多数の検体の同時解析を行うための装置；

33. タンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、

a. 下記の工程：

(1)タンパク質のC末端をラベル化してC末端ラベル化タンパク質を製造する工程；

(2)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(3)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には

該タンパク質と該標的分子とが相互作用すると判定する工程を含む方法；並びに

b. 上記工程(1)ないし(3)に続き、

(4)相互作用すると判定された該タンパク質及び該標的分子を特定する工程を含む方法；

34. 特定のタンパク質と相互作用する分子又は特定の分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、

a. 下記の工程：

(1)該タンパク質を含むC末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(2)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には該タンパク質と該標的分子とが相互作用すると判定する工程

を含む方法；並びに

b. 上記工程(1)及び(2)に続き、

(3)相互作用すると判定された該タンパク質及び該標的分子を特定する工程を含む方法；

35. タンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質のスクリーニング方法であって、下記の工程：

(1)該タンパク質を含むC末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(2)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には該タンパク質と該標的分子とが相互作用すると判定する工程

を含む方法。

36. 上記35でスクリーニングされた上記タンパク質と相互作用する分子又は上記分子と相互作用するタンパク質；

37. 上記33又は34に記載のタンパク質に相互作用する分子の同定方法に使

用するためのC末端ラベル化タンパク質；

38. 上記35に記載のスクリーニング方法に使用するためのC末端ラベル化タンパク質

が提供される。

図面の簡単な説明

第1図は、ピューロマイシン及びその誘導体の化学構造である。IはPuromycin、IIはrCpPur、IIIはdCpPur、IVはdUpPurである。

第2図は、蛍光物質と結合したピューロマイシンの化学構造である。IはFluorpur、IIはFluorthiopurである。

第3図は、ラベル部としてのリガンドが、固相に結合したアダプタータンパク質を介して結合した固相化C末端タンパク質をあらわした模式図である。

第4図は、蛍光偏光解消測定装置によりドメインBとヒトIgGとの相互作用を測定し、その結果を各ヒトIgGの濃度に対する偏光度の変化として示した図である。

第5図は、ビオチンピューロマイシン(Biotin-puro)でラベル化されたタンパク質の蛍光強度を蛍光イメージングアナライザーのディスプレイ上に表示した写真である。

第6図は、蛍光イメージングアナライザーによる固相化BドメインとヒトIgGとの相互作用の強度を蛍光強度として蛍光イメージングアナライザーのディスプレイ上に表示した写真である。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明をさらに詳細に説明する。

(1) C末端ラベル化タンパク質

(1-1) C末端ラベル化タンパク質の構成

本発明のタンパク質-分子間相互作用解析方法は、C末端ラベル化タンパク質

を用いることに一つの特徴を有する方法である。C末端ラベル化タンパク質は、タンパク質部と該タンパク質のC末端がラベル化試薬により標識（ラベル）されているラベル部とにより構成される。

「タンパク質部」とは、その機能が既知又は未知である相互作用の解析対象として用いるタンパク質部を意味し、このタンパク質部と後述する標的分子との相互作用の有無の測定が行われる。

このタンパク質部は、天然タンパク質又はその変異体、及び人工タンパク質又はその変異体の何れでもよい。天然タンパク質としては、種々の生物の器官、組織又は細胞に由来するcDNAライブラリーから転写、翻訳される多様性を有するタンパク質のライブラリーをも含むものである。人工タンパク質としては、天然タンパク質の全てもしくは部分配列を組み合わせた配列、又はランダムなアミノ酸配列を含むものである。

(1-2) ラベル化試薬

「ラベル化試薬」は、標識物質を含む「ラベル部」と、タンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物を含む「アクセプター部」とを含む。ラベル部とアクセプター部とは化学結合で連結されている。ラベル部とアクセプター部とは直接化学結合していてもよく、またスペーサーを介して化学結合していてもよい。

標識物質は、通常は蛍光性物質などの非放射性標識物質から選択される。蛍光物質としては、フリーの官能基（例えば活性エステルに変換可能なカルボキシル基、ホスホアミダイドに変換可能な水酸基、あるいはアミノ基など）を持ち、ビユーロマイシン又はビユーロマイシン様化合物などの上記核酸誘導体に連結可能な種々の蛍光色素、例えばフルオレセイン系列、ローダミン系列、エオシン系列、NBD系列などのいかなるものであってもよい。その他、ラベル部としては後述する特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子（以下、「リガンド」と称することがある）、タンパク質、ペプチド、糖類、脂質類、色素、ポリエチレングリコールなどの非放射性標識物質、あるいはラベル化可能な化合物であれば、その化合物の種類、大きさを問わない。

これらの標識物質は、C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づいて発生される信号の変化の測定に適したものが適宜用いられる。

ラベル化試薬を構成する「アクセプター部」としては、通常は核酸誘導体がいられる。この核酸誘導体としては、無細胞タンパク質合成系又は生細胞中でタンパク質の合成（翻訳）が行われた時に、合成されたタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物である限り限定されないが、その3'末端がアミノアシル tRNA に化学構造骨格が類似しているものを選択することができる。代表的な化合物として、アミド結合を有するピューロマイシン (Puromycin)、3'-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌクレオシド (3'-N-Aminoacylpuromycin aminonucleoside、PANS-アミノ酸)、たとえば、アミノ酸部がグリシンの PANS-Gly、アミノ酸部がバリンの PANS-Val、アミノ酸部がアラニンの PANS-Ala、その他、アミノ酸部が全ての各アミノ酸に対応する PANS-アミノ酸化合物が挙げられる。

また、3'-アミノアデノシンのアミノ基とアミノ酸のカルボキシル基が脱水縮合して形成されるアミド結合で連結した3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシド (3'-Aminoacyladenine aminonucleoside, AANS-アミノ酸)、たとえば、アミノ酸部がグリシンの AANS-Gly、アミノ酸部がバリンの AANS-Val、アミノ酸部がアラニンの AANS-Ala、その他、アミノ酸部が全アミノ酸の各アミノ酸に対応する AANS-アミノ酸化合物を使用できる。

また、ヌクレオシドあるいはヌクレオシドとアミノ酸のエステル結合したものなども使用できる。さらにまた、核酸あるいは核酸に類似した化学構造骨格及び塩基を有する物質と、アミノ酸に類似した化学構造骨格を有する物質とを化学的に結合した化合物は、すべて本方法において用いられる核酸誘導体に含まれる。

アクセプター部としては、ピューロマイシン、PANS-アミノ酸もしくはAANS-アミノ酸がリン酸基を介してヌクレオシドと結合している化合物がより好ましい。これらの化合物の中でピューロマイシン（第1図の(I)）、リボシジルピューロマイシン (rCpPur:第1図のII)、デオキシリボシジルピューロマ

イシン(dCpPur:第1図のIII)、デオキシウリジルビューロマイシン(dUpPur:第1図のIV)などのビューロマイシン誘導体が特に好ましい。

ラベル化試薬は、上記ラベル部とアクセプター部とを所望によりスペーサーを介して、それ自体既知の化学結合方法によって結合させることにより製造することができる。具体的には、例えば、適当な保護基で保護された上記アクセプター部を固相担体上に結合させ、核酸合成機を用いてスペーサーとしてスペーサーホスホアミダイト、ラベル部として蛍光物質などを結合したホスホアミダイトを順次結合させた後、脱保護を行うことによって作成することができる。上記各部の種類、あるいは結合の種類によっては液相合成法で結合させるかあるいは両者を併用することもできる。また、ラベル部としてニッケル等の金属イオンを結合させるには、金属イオンが配位しうるニトリロトリ酢酸やイミノジ酢酸等のキレート性の試薬を用いて行うことができる。

ラベル部とアクセプター部をつなぐスペーサーとしては、ポリエチレン、ポリエチレングリコールなどの高分子物質が用いられ、好ましくはポリエチレングリコールが用いられる。

(1-3) C末端ラベル化タンパク質の調製

本発明で用いるC末端ラベル化タンパク質の調製法は特に制限されないが、例えば、上記ラベル化試薬の存在下で、前記タンパク質部をコードするコーディング領域をT7等のウイルスや細胞に由来するプロモーター領域の制御下に連結し、これを転写することによりmRNAを合成する。該コーディング領域DNAとしては、ラベル化の効率が数十倍よくするためにストップコドンを削除した配列が好ましく用いられる。また、それ自体既知の方法で生体から取得されたmRNAを用いることもできる。これらのmRNAは、翻訳系で発現させてタンパク質合成を行わせることにより調製することができる。

用いられる翻訳系としては、無細胞翻訳系又は生細胞などが挙げられる。無細胞翻訳系又は生細胞などは、その中にタンパク質をコードする核酸を添加又は導入することによってタンパク質合成が行われるものである限り制限されない。無

細胞翻訳系としては、原核又は真核生物の抽出物により構成される無細胞翻訳系、例えば大腸菌、ウサギ網状赤血球、小麦胚芽抽出物などが使用できる。生細胞翻訳系としては、原核又は真核生物、例えば大腸菌の細胞などが使用できる。無細胞翻訳系を用いる場合、用いる核酸がDNAである場合、それ自体既知のRNAポリメラーゼなどを用いる方法により転写して合成したRNAを鋳型として導入する。

この翻訳系において、ラベル化試薬を適当な濃度で存在させることにより合成されたタンパク質部のC末端にアクセプター部を介してラベル物質を結合させることができる。存在させるラベル化試薬の濃度としては、実際に用いるラベル化試薬、核酸、あるいは翻訳系によって異なるが、一般的には最終濃度が200～0.1 μ Mの範囲が好ましく用いられる。

好ましいラベル化試薬の濃度の選定は、種々の濃度のラベル化試薬を、用いる鋳型核酸とともに翻訳系に投入し、合成されたタンパク質を適当な方法で分離した後、タンパク質より発せられる信号の強度を測定し、最も高い値を示した系に投入したラベル化試薬の濃度を選択することによって行うことができる。

このようにして選定した、ラベル化試薬の濃度として具体的には、鋳型となる核酸が、T7プロモータとチオレドキシンのコーディング領域の全長DNA、ラベル化試薬がビューロマイシンとフルオレセインの結合体で、翻訳系がウサギ網状赤血球抽出液を用いた場合には、0.1～1 μ M、また翻訳系に小麦胚芽抽出液を用いた場合には10～50 μ Mである。

本方法に用いるラベル物質が結合した核酸誘導体の濃度としては、実際に使用するRNA、ラベル物質、核酸誘導体、及び翻訳系等によって異なるが、下記の方法等により当業者は該濃度を適宜決定することができる。

上記したC末端ラベル化タンパク質を作成する系において、ラベル物質が結合した核酸誘導体、例えばフルオレセニルビューロマイシン（Fluorpur：第2図のI）を濃度を違えて添加し、得られた翻訳産物をSDSポリアクリルアミド電気泳動を用いる等して分離し、C末端に結合しているラベル物質より発せられる信

号強度を測定し、最も信号強度の高い値を示した濃度を選択する。具体的には、T 7 プロモータの制御下にあるチオレドキシンのコーディング領域の全長を、Fluorpur、もしくは Fluorthiopur (第 2 図の I I) の存在下で大腸菌の無細胞転写翻訳系においてタンパク質を合成する場合には、Fluorpur、もしくは Fluorthiopur の最適濃度は、 $0.1 \sim 1 \mu\text{M}$ である。またウサギ網状赤血球抽出液を用いた場合には $0.3 \sim 50 \mu\text{M}$ 、小麦胚芽抽出液を用いた場合には $10 \sim 50 \mu\text{M}$ である。

このようにして合成された C 末端ラベル化タンパク質は、翻訳系に生細胞を用いた場合は細胞をそれ自体既知の方法で溶解後、ゲル濾過など (例えば、Bio-Spin 6; BIO-Rad 社製) によって未反応のラベル化試薬を除去し、取得することができる。また、無細胞翻訳系を用いた場合には、ゲル濾過によって未反応のラベル化試薬を除去すればよい。

また、本発明においては C 末端ラベル化タンパク質を固相に結合させる場合があるが、固相に結合させる方法としては、ラベル部を介して結合させる方法と、ラベル部以外の部分により結合させる方法が挙げられる。

ラベル部を介して結合させる場合に用いられるラベル部は特定のポリペプチドに特異的に結合する分子 (以下、「リガンド」と称することがある。) であり、固相表面には該リガンドと結合する特定のポリペプチド (以下、「アダプタータンパク質」と称することがある) を結合させる (第 3 図)。アダプタータンパク質としては、結合タンパク質、受容体を構成する受容体タンパク質、抗体も含まれる。

アダプタータンパク質/リガンドの組み合わせとしては、例えば、アビジン及びストレプトアビジン等のビオチン結合タンパク質/ビオチン、マルトース結合タンパク質/マルトース、G タンパク質/グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド/ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ/グルタチオン、DNA 結合タンパク質/DNA、抗体/抗原分子 (エピトープ)、カルモジュリン/カルモジュリン結合ペプチド、ATP 結合タンパク質/ATP、あるいはエストラジオール受容体タンパク質/エストラジ

オールなどの、各種受容体タンパク質／そのリガンドなどが挙げられる。

これらの中で、アダプタータンパク質／リガンドの組み合わせとしては、アビジン及びストレプトアビジンなどのビオチン結合タンパク質、マルトース結合タンパク質／マルトース、ポリヒスチジンペプチド／ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ／グルタチオン、抗体／抗原分子（エピトープ）などが好ましく、特にストレプトアビジン／ビオチンの組み合わせが最も好ましい。これらの結合タンパク質は、それ自体既知のものであり、該タンパク質をコードするDNAは既にクローニングされている。

アダプタータンパク質の固相表面への結合は、それ自体既知の方法を用いることができるが、具体的には、例えば、タンニン酸、ホルマリン、グルタルアルデヒド、ピルビクアルデヒド、ビス-ジアゾ化ベンジゾン、トルエン-2,4-ジイソシアネート、アミノ基、カルボキシル基、又は水酸基あるいはアミノ基などを利用する方法を用いることができる。

ラベル部以外の部分により固相に結合させる場合は、通常はタンパク質を固相に結合させるのに用いられる既知の方法、例えばタンニン酸、ホルマリン、グルタルアルデヒド、ピルビクアルデヒド、ビス-ジアゾ化ベンジゾン、トルエン-2,4-ジイソシアネート、アミノ基、カルボキシル基、又は水酸基あるいはアミノ基などを利用して行うことができる。

(2) 標的分子

「標的分子」とは、本発明においてC末端ラベル化タンパク質と相互作用する分子を意味し、具体的にはタンパク質、核酸、糖鎖、低分子化合物などが挙げられる。

タンパク質としては、C末端ラベル化タンパク質と相互作用する能力を有する限り特に制限はなく、タンパク質の全長であっても結合活性部位を含む部分ペプチドでもよい。またアミノ酸配列、及びその機能が既知のタンパク質でも、未知のタンパク質でもよい。これらは、合成されたペプチド鎖、生体より精製されたタンパク質、あるいはcDNAライブラリー等から適当な翻訳系を用いて翻訳し、

精製したタンパク質等でも標的分子として用いることができる。合成されたペプチド鎖はこれに糖鎖が結合した糖タンパク質であってもよい。これらのうち好ましくはアミノ酸配列が既知の精製されたタンパク質か、あるいはcDNAライブラリー等から適当な方法を用いて翻訳、精製されたタンパク質を用いることができる。

核酸としては、C末端ラベル化タンパク質と相互作用する能力を有する限り、特に制限はなく、DNAあるいはRNAも用いることができる。また、塩基配列あるいは機能が既知の核酸でも、未知の核酸でもよい。好ましくは、タンパク質に結合能力を有する核酸としての機能、及び塩基配列が既知のものか、あるいはゲノムライブラリー等から制限酵素等を用いて切断単離してきたものを用いることができる。

糖鎖としては、C末端タンパク質と相互作用する能力を有する限り、特に制限はなく、その糖配列あるいは機能が、既知の糖鎖でも未知の糖鎖でもよい。好ましくは、既に分離解析され、糖配列あるいは機能が既知の糖鎖が用いられる。

低分子化合物としては、C末端タンパク質と相互作用する能力を有する限り、特に制限はない。機能が未知のものでも、あるいはタンパク質に結合する能力が既に知られているものでも用いることができる。

これら標的分子がC末端タンパク質と行う「相互作用」とは、通常は、タンパク質と標的分子間の共有結合、疎水結合、水素結合、ファンデルワールス結合、及び静電力による結合のうち少なくとも1つから生じる分子間に働く力による作用を示すが、この用語は最も広義に解釈すべきであり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。共有結合としては、配位結合、双極子結合を含有する。また静電力による結合とは、静電結合の他、電気的反発も含有する。また、上記作用の結果生じる結合反応、合成反応、分解反応も相互作用に含有される。

相互作用の具体例としては、抗原と抗体間の結合及び解離、タンパク質レセプターとリガンドの間の結合及び解離、接着分子と相手方分子の間の結合及び解離、酵素と基質の間の結合及び解離、核酸とそれに結合するタンパク質の間の結合及

び解離、情報伝達系におけるタンパク質同士の間の結合と解離、糖タンパク質とタンパク質との間の結合及び解離、あるいは糖鎖とタンパク質との間の結合及び解離が挙げられる。

用いられる標的分子は、態様に応じて標識物質により標識して用いることができる。標識物質は、通常、蛍光性物質などの非放射性標識物質から選択される。蛍光物質としては、フリーの官能基（例えばカルボキシル基、水酸基、アミノ基など）を持ち、タンパク質、核酸等の上記標的物質と連結可能な種々の蛍光色素、例えばフルオレセイン系列、ローダミン系列、エオシン系列、NBD系列などのいかなるものであってもよい。その他、色素など標識化可能な化合物であれば、その化合物の種類、大きさは問わない。

これらの標識物質は、標的分子とC末端ラベル化タンパク質との間の相互作用に基づいて発生される信号の変化の測定又は解析方法に適したものが適宜用いられる。

上記標識物質の標的分子への結合は、それ自体既知の適当な方法を用いて行うことができる。具体的には、例えば、標的分子がタンパク質の場合、上記1.に記載したC末端を標識化する方法等を用いることができる。また標的分子が核酸の場合は、予め標識物質を共有結合などで結合させたオリゴDNAプライマーを用いたPCRを行う方法などによって簡便に標識化することができる。

また、本発明に用いられる標的分子は態様に応じて、固相に結合させる場合があるが、固相に結合させる方法としては、標識物質を介して結合させるものと、それ以外の部分により結合させるものが挙げられる。

標識物質を介して結合させる場合に用いられる標識物質はリガンドであり、固相表面には該リガンドと結合するアダプタータンパク質を結合させる。

アダプタータンパク質／リガンドの組み合わせとしては、例えば、アビジン及びストレプトアビジン等のビオチン結合タンパク質／ビオチン、マルトース結合タンパク質／マルトース、Gタンパク質／Gアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド／ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン-S-ト

ランスフェラーゼ／グルタチオン、DNA結合タンパク質／DNA、抗体／抗原分子（エピトープ）、カルモジュリン／カルモジュリン結合ペプチド、ATP結合タンパク質／ATP、あるいはエストラジオール受容体タンパク質／エストラジオールなどの各種受容体タンパク質／そのリガンドなどが挙げられる。

これらの中で、アダプタータンパク質／リガンドの組み合わせとしては、アビジン及びストレプトアビジンなどのビオチン結合タンパク質、マルトース結合タンパク質／マルトース、ポリヒスチジンペプチド／ニッケルあるいはコバルト等の金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ／グルタチオン、抗体／抗原分子（エピトープ）、などが好ましく、特にストレプトアビジン／ビオチンの組み合わせが最も好ましい。これらの結合タンパク質は、それ自体既知のものであり、該タンパク質をコードするDNAは既にクローニングされている。

アダプタータンパク質の固相表面への結合は、それ自体既知の方法を用いることができるが、具体的には、例えば、タンニン酸、ホルマリン、グルタルアルデヒド、ピルビクアルデヒド、ビス-ジアゾ化ベンジゾン、トルエン-2,4-ジイソシアネート、アミノ基、活性エステルに変換可能なカルボキシル基、又はホスホアミダイドに変換可能な水酸基あるいはアミノ基などを利用する方法を用いることができる。

標識物質以外の部分により固相に結合させる場合は、通常タンパク質、核酸、糖鎖、低分子化合物を固相に結合させるのに用いられる既知の方法、具体的には例えば、タンニン酸、ホルマリン、グルタルアルデヒド、ピルビクアルデヒド、ビス-ジアゾ化ベンジゾン、トルエン-2,4-ジイソシアネート、アミノ基、活性エステルに変換可能なカルボキシル基、又はホスホアミダイドに変換可能な水酸基あるいはアミノ基などを利用する方法を用いることができる。

（３）信号の変化の測定法

上記で得られたC末端ラベル化タンパク質と標的分子を、標識物質の種類又は固相化の方法により適宜組み合わせてC末端タンパク質と接触せしめ、該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号において両分子間の相互作用に

基づいて発生される上記信号の変化を測定、検出することにより相互作用を解析する。

「測定」とは解析のために用いられる信号の変化を収集するための手段であり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。用いられる測定法としては、例えば、表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場分子イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、固相酵素免疫検定法、蛍光偏光解消法、及び蛍光相関分光法等が挙げられる。

(3-1) 表面プラズモン共鳴法

表面プラズモン共鳴法とは、金属／液体界面で相互作用する分子によって表面プラズモンが励起され、これを反射光の強度変化で測定する方法である (Cullen, D.C., et al., Biosensors, 3(4), 211-225(1987-88))。この方法を用いてタンパク質-分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、C末端ラベル化タンパク質は上記した方法により固相化されていることが必要であるが、標的分子の標識化は必要ない。

C末端ラベル化タンパク質を固相化するための基盤としては、ガラスの等の透明基盤上に金、銀、白金等の金属薄膜が構成されたものが用いられる。透明基盤としては、通常表面プラズモン共鳴装置用に用いられるものであればいかなるものであってもよく、レーザー光に対して透明な材料からなるものとして一般的にはガラス等からなるものであり、その厚さは0.1～5mm程度のものが用いられる。また金属薄膜の膜厚は100～2000Å程度が適当である。このような表面プラズモン共鳴装置用固基盤として市販されているものも用いることができる。C末端ラベル化タンパク質の上記基盤への固相化は前述した方法により行うことができる。

本方法において標的分子をC末端ラベル化タンパク質へ接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分な程度に接触する方法であればいかなるものであってもよいが、好ましくは標的分子を生化学的に通常使用される緩衝液に適当な濃度で溶解した溶液に固相化されたC末端タンパク質を接触させる方法を用

いることができる。

これらの行程は市販の表面プラズモン共鳴装置、例えば BIAcore2000 (Pharmacia Biosensor 社製)によってもよい。

両分子を接触せしめた後、それ自体既知の表面プラズモン共鳴装置を用いて、それぞれの反射光の相対強度の時間的変化を測定することにより、固相化された C 末端ラベル化タンパク質と標的分子の相互作用が解析できる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記表面プラズモン共鳴装置に用いられる基盤に、複数の C 末端ラベル化タンパク質を番地付けして固相化するか、あるいは 1 種類の固相化された C 末端ラベル化タンパク質に複数種の標的分子を接触させる方法等が用いられる。

(3-2) エバネッセント場分子イメージング法

エバネッセント場分子イメージング法とは、Funatsu, T., et al., Nature, 374, 555-559 (1995)等に記載されている方法で、ガラス等の透明体に固相化した分子に溶液として第 2 の分子を接触せしめ、これにエバネッセント場が発生する角度でレーザー光等の光源を照射し、発生したエバネッセント光を検出器によって測定又は解析する方法である。これらの操作は、それ自体既知のエバネッセント場蛍光顕微鏡装置を用いて行うことができる。

この方法を用いてタンパク質-分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、C 末端ラベル化タンパク質あるいは標的分子のいずれか一方は上記した方法により固相化されていることが必要である。標的分子は固相化する場合は標識の必要はないが、固相化しないで用いる場合には上記した標識物質により標識化されていることが必要である。

C 末端ラベル化タンパク質、あるいは標的分子を固相化するための基盤としては、ガラス等の材質の基盤が用いられ、好ましくは石英ガラスが用いられる。また、レーザー光の散乱等を防ぐために表面を超音波洗浄したものが好ましい。

本方法において固相化していない C 末端ラベル化タンパク質あるいは標識化標的分子を固相化分子へ接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分

な程度に接触する方法であればいかなるものであってもよいが、好ましくは固相化していないC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化標的分子を生化学的に通常使用される緩衝液に適当な濃度で溶解した溶液を作成し、これを固相表面に滴下する方法が好ましい。

両分子を接触せしめた後、エバネッセント場照明により励起された蛍光をCCDカメラ等の検出器を用いて測定することにより、固相化された分子と相互作用する分子を同定することができる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記基盤に、複数のC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化標的分子を番地付けして固相化する方法等が用いられる。

(3-3) 蛍光イメージングアナライズ法

蛍光イメージングアナライズ法は、固相化された分子に、標識化分子を接触せしめ、両分子の相互作用により、固相化された分子上にとどまった標識化分子から発せられる蛍光を、市販の蛍光イメージングアナライザーを用いて測定又は解析する方法である。

この方法を用いてタンパク質-分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、C末端ラベル化タンパク質あるいは標的分子のいずれか一方は上記した方法により固相化されていることが必要である。標的分子は固相化して用いる場合には標識されているものと、されていないもののどちらも利用可能である。また、固相化しないで用いる場合には上記した標識物質により標識化されていることが必要である。C末端ラベル化タンパク質は、ラベル部を介して固定化されているものも、ラベル部以外の部分で固定化されているものも用いることができる。

C末端ラベル化タンパク質、あるいは標的分子を固相化するための基盤としては、通常タンパク質や核酸等を固定化するのに用いられるニトロセルロースメンブレンやナイロンメンブレン、あるいはプラスチック製のマイクロプレート等も用いることができる。

本方法において標識化標的分子あるいはC末端ラベル化タンパク質を固相化分

子へ接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分な程度に接触する方法であればいかなるものであってもよいが、好ましくは標識化標的分子あるいはC末端ラベル化タンパク質を生化学的に通常使用される緩衝液に適当な濃度で溶解した溶液を作成し、これを固相表面に接触させる方法が好ましい。

両分子を接触せしめた後、好ましくは過剰に存在する標識化標的分子あるいはC末端ラベル化タンパク質を同緩衝液等により洗浄する工程を行い、固相上にとどまった標的分子あるいはC末端ラベル化タンパク質の標識物質から発せられる蛍光信号、又は固相化されている標識化分子から発せられる蛍光と固相上にとどまった標識化分子から発せられる蛍光が混ざり合った信号を、市販のイメージングアナライザーを用いて測定あるいは解析することにより、固相化された分子と相互作用する分子を同定することができる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記固相表面に、複数のC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化又は非標識化標的分子を番地付けして固相化する方法、あるいは1種類のC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化又は非標識化標的分子に固相化されていない複数種のC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化標的分子を接触させる方法等が用いられる。複数種のC末端ラベル化タンパク質あるいは標識化標的分子を接触させる場合には、固相にとどまった該分子を緩衝液の濃度の差等により解離させて取得し、これを既知の方法により分析することにより同定できる。

(3-4) 固相酵素免疫検定法

固相酵素免疫検定法 (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA): Crowther, J.R., Methods in Molecular Biology, 42 (1995)) は、固相上に固定化した抗原に対し、抗体を含む溶液を接触せしめ、両分子の相互作用 (抗原抗体反応) により、固相化された抗原上にとどまった抗体をこれと特異的に結合する標識化分子 (IgG等) から発せられる蛍光、あるいは標識化分子を基質とする色素から発せられる信号を、市販の検出器 (ELISAリーダー) を用いて測定又は解析する方法である。

この方法を用いてタンパク質—分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、抗原となるC末端ラベル化タンパク質を上記した方法により固相化されていることが必要である。また抗体となる標的分子は上記した標識物質により標識化されていることが必要である。

抗原となるC末端ラベル化タンパク質を固相化するための基盤としては、通常ELISAに用いられるプラスチック製のマイクロプレート等も用いることができる。

本方法において抗体となる標識化標的分子を固相分子へ接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分な程度に接触する方法であればいかなるものであってもよいが、好ましくは標識化標的分子を生化学的に通常使用される緩衝液に適当な濃度で溶解した溶液を作成し、これをマイクロプレートに注入する方法が好ましい。

両分子を接触せしめた後、好ましくは過剰に存在する固相化分子に結合していない標識化分子を同緩衝液等により洗浄する工程を行い、固相上にとどまった標識分子から発せられる蛍光を、市販のELISAリーダー等を用いて測定あるいは解析することにより、固相化された抗原分子と相互作用する分子を同定することができる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記マイクロプレートの各穴にそれぞれ異なる複数の標識化標的分子を固相化する方法が用いられる。

(3-5) 蛍光偏光解消法

蛍光偏光法 (Perran, J., et al., J. Phys. Rad., 1, 390-401(1926)) は、蛍光偏光で励起された蛍光分子が、励起状態の間、定常状態を保っている場合には同一の偏光平面で蛍光を放射するが、励起された分子が励起状態中に回転ブラウン運動等を行った場合に、放射された蛍光は励起光とは異なった平面になることを利用する方法である。分子の運動はその大きさに影響を受け、蛍光分子が高分子である場合には、励起状態の間の分子の運動はほとんどなく、放射光は偏光を

保ったままになっているのに対して、低分子の蛍光分子の場合は、運動速度が速いために放射光の偏光が解消される。そこで、平面偏光で励起された蛍光分子から放射される蛍光の強度を、元の平面とそれに垂直な平面とで測定し、両平面の蛍光強度の割合からこの分子の運動性及びその存在状態に関する情報が得られるものである。この方法によれば、夾雑物があってもこれに影響されることなく、蛍光ラベル化された分子と相互作用する標的分子の挙動を追跡できる。これは蛍光ラベル化された分子と標的分子が相互作用するときのみ、偏光度の変化として測定されるからである。

この方法を行うための装置としては例えば BECON (Panyera 社製) 等が市販されており、本方法もこれらの装置を用いることにより行うことができる。

この方法を用いてタンパク質-分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、C末端ラベル化タンパク質あるいは標的分子のいずれも溶液として供する必要がある。標的分子は標識の必要はない。また相互作用を調べようとするC末端ラベル化タンパク質より非常に分子量の小さい分子は、C末端ラベル化タンパク質のブラウン運動に影響を及ぼさないため本方法においてはふさわしくない。

本方法においてC末端ラベル化タンパク質に標的分子を接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分な程度に接触する方法であれば如何なるものであってもよいが、好ましくは市販の蛍光偏光解消装置の測定用ウェルに通常生化学的に用いられる緩衝液等に適当な濃度でC末端ラベル化タンパク質溶解した溶液を投入し、さらに同緩衝液に適当な濃度で標的分子を溶解した溶液を投入する方法によって行われる。

本方法において測定するC末端ラベル化タンパク質及び標的分子との間の相互作用は、必ずしも抗原抗体方法ほど特異性は高くないことが考えられるため、最適の組み合わせを検出するためには、相互作用の程度を数値化することが有効である。相互作用の程度を示す指標としては、例えば一定濃度のC末端ラベル化タンパク質に対して、極大蛍光偏光度を与える最小標的物濃度の値等を用いることができる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記蛍光偏光解消法測定装置の各測定用ウェルにそれぞれ異なる複数のC末端ラベル化タンパク質を投入し、これに特定の標的分子溶液を投入するか、あるいは特定のC末端ラベル化タンパク質を投入し、各ウェルに互いに異なる複数種の標的分子溶液を投入する方法が用いられる。

(3-6) 蛍光相関分光法

蛍光相関分光法 (Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) : Eigen, M., et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 5740-5747(1994)) は、共焦点レーザー顕微鏡等の下で、粒子の流動速度、あるいは拡散率、容積収縮等を測定する方法であり、本発明においては、C末端ラベル化タンパク質と標的分子間の相互作用により元のラベル化分子1分子の並進ブラウン運動の変化を測定することにより、相互作用する分子を測定することができる。

具体的には資料粒子が励起光により励起されて、資料液容積の一部において蛍光を放射し、この放射光を測定し光子割合を得る。この値は、特定の時間に観測されている空間容積中に存在する粒子の数と共に変化する。上述した種々のパラメータは自己相関関数を使用してこの信号の変動から算出され得る。このFCSを行う為の装置もカールツァイス (Zeiss) 社等から市販されており、本方法においてもこれらの装置を用いて解析を行うことができる。

この方法を用いてタンパク質-分子間相互作用の測定又は解析を行う場合、C末端ラベル化タンパク質あるいは標的分子のいずれも溶液として供することが必要である。標的分子は標識の必要はない。また相互作用を調べようとするC末端ラベル化タンパク質より非常に分子量の小さい分子は、C末端ラベル化タンパク質のブラウン運動に影響を及ぼさないため本方法においてはふさわしくない。

本方法においてC末端ラベル化タンパク質に標的分子を接触せしめる方法としては、両分子が相互作用するに十分な程度に接触する方法であれば如何なるものであってもよいが、好ましくは市販のFCS用装置の測定用ウェルに通常生化学的に用いられる緩衝液等に適当な濃度でC末端ラベル化タンパク質溶解した溶液

を投入し、さらに同緩衝液に適当な濃度で標的分子を溶解した溶液を投入する方法によって行われる。

この方法において、同時に多数の解析を行う方法としては、例えば上記FCS用測定装置の各測定用ウェルにそれぞれ異なる複数のC末端ラベル化タンパク質を投入し、これに特定の標的分子溶液を投入するか、あるいは特定のC末端ラベル化タンパク質を投入し、各ウェルに互いに異なる複数種の標的分子溶液を投入する方法が用いられる。

(4) 相互作用する分子の同定方法

上記(3)のそれぞれの方法により測定されC末端ラベル化タンパク質との間に相互作用が認められた分子は、該分子の一次構造が未知の場合、それ自体既知の適当な方法により、その一次構造を解析することができる。具体的には、相互作用を認められた標的分子がタンパク質の場合、アミノ酸分析装置等によりアミノ酸配列を解析し、一次構造を特定することができる。また、標的分子が核酸の場合には、塩基配列決定方法により、オートDNAシーケンサーなどを用いれば塩基配列を決定することができる。

(5) C末端ラベル化タンパク質の固相化のための装置

上記(1-3)に記載したC末端ラベル化タンパク質のラベル部を介した固相への固定化方法を行うために、既知の適切な手段を組み合わせることで装置を構築することもできる。本装置における各手段自体はそれぞれ既知のものであり、これらの手段における、基盤の保持、C末端ラベル化タンパク質溶液の添加、洗浄等の各操作は、それ自体既知の方法により行えばよい。これらの操作を組み合わせ、全自動又は半自動の、C末端ラベル化タンパク質の固相化のための装置を構築することができる。

(6) タンパク質-分子間相互作用測定のための装置

上記(3)に記載したタンパク質-分子間相互作用測定を行うために、既知の適切な手段を組み合わせることで装置を構築することもできる。本装置における各手段自体はそれぞれ既知のものであり、これらの手段における、基盤の保持、標的分子

子の添加、洗浄、信号検出等の各操作は、それ自体既知の方法により行えばよい。これらの操作を組み合わせ、全自動又は半自動の、タンパク質-分子間相互作用測定のための装置を構築することができる。

実施例

以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明するが、下記の実施例は本発明についての具体的認識を得る一助とみなすべきものであり、本発明の範囲は下記の実施例により何ら制限されるものではない。

実施例1 ストップコドンを削除した鑄型を用いたタンパク質のC末端ラベルの効率化の解析

(1) 転写用 DNA の構築と mRNA の作成

転写効率の高い大腸菌ウィルス T 7 の RNA ポリメラーゼによって認識される DNA 配列 (T 7 プロモーター配列) と翻訳の際に真核細胞のリボソームによって認識されやすい DNA 配列 (K o z a k コンセンサス配列) を持つ領域、及びその下流に β -ラクタマーゼをコードする DNA が連結した DNA 断片を、次のようにして構築した。

まず、T 7 プロモーター配列 (Rosenberg, A.H., et al., Gene, 56, 125-135 (1987)) と K o z a k コンセンサス配列を含む 1 本鎖 DNA (配列番号 1) を化学合成し、DNA プライマー (配列番号 2) と DNA/RNA プライマー (配列番号 3) によってポリメラーゼ連鎖反応 (P C R) を行った。一方、 β -ラクタマーゼ遺伝子を、DNA/RNA プライマー (配列番号 4) と DNA プライマー (配列番号 5) で P C R することにより、 β -ラクタマーゼをコードする DNA を増幅した。これらを R R R 法 (Nishigaki, K., et al., Chem. Lett., 131-132(1995)) に従って、それぞれの P C R 反応液にリボヌクレアーゼ A (シグマ社製) を加え、60°C で 30 分反応させることによって DNA/RNA プライマー (配列番号 3, 4) の RNA の 3' 側のリン酸ジエステル結合を切断して突出末端を作った。これらをフェノール抽出後、プライマーリムーバー (Primer

remover: Edge Biosystems 社製) によってプライマー及び切断されたDNA断片を除去し、エタノール沈殿を行った。沈殿を乾燥後、T4 DNAリガーゼ用バッファーに溶解し、T4 ポリヌクレオチドキナーゼ (Polynucleotide Kinase: NEB 社製) を加えて45°C、30分反応後、さらに30分かけて徐々に16°Cに温度を下げてからT4 DNAリガーゼ (NEB 社製) を加え、上述の2つのDNA領域を結合させた。この反応液の一部を採取し、DNAプライマー (配列番号2及び5) を使って再度PCRで増幅し、転写用鋳型とした。PCRはAmpliTaq Gold DNA Polymerase (Perkin-Elmer 社製) を用いた。

β -ラクタマーゼのストップコドンを除いたDNAプライマー (配列番号6) を上記DNAプライマー (配列番号5) の代わりに用いて上記と同様の操作を行うことにより、ストップコドンを除いた β -ラクタマーゼをコードするDNAを含む転写用鋳型を作成した。

このようにして作成したストップコドンを含む β -ラクタマーゼをコードするDNA、及びストップコドンを除いた β -ラクタマーゼをコードするDNAは、RNA合成キット (Ribomax Large Scale RNA Production System: Promega 社製) を用いて転写し、RNAとした。合成効率を上げるためにキャップアナログ (RNA capping Analogue: Gibco BRL 社製) を用い、mRNAの5'末端を修飾した。キャップアナログ及び過剰の基質 (NTP) を除去するためにプライマーリムーバー (Edge Biosystems 社製) を使ってエタノール沈殿を行った。

(2) 蛍光ラベル化試薬の調製

ビューロマイシン (Puromycin: SIGMA 社製) を3mlの乾燥ピリジンに溶解し、減圧下で蒸発させ、脱水させた。この操作を3回繰り返した。これに5mlの4% テトラゾール/アセトニトリル溶液とフルオレダイト (6-N-carboxy-di-0-pivaloyl-fluorescein-hexyl-0-(2-cyanoethyl)-(N,N'-diisopropyl)-phosphoamidite: 日本バーセブティブ社製) を加え、室温で攪拌した。反応はシリカゲルの薄層クロマトグラフィー (TLC、展開溶媒、クロロフォルム: メタノール = 9:1) でモニターした。通常、反応は2時間で終了する。反応後、溶媒を減

圧下で追い出し、これに0.1 Mのヨウ素をテトラヒドロフラン／ピリジン／水＝80：40：2に溶解した溶液2 mlを添加し、室温で攪拌しながら生成したフォスファイトトリエステルを酸化させた。90分後、溶媒を減圧下で除去し、残部をクロロフォルムで抽出した。抽出液は無水硫酸マグネシウム存在下で乾燥させた後、減圧下で溶媒を除去した。これをシリカゲルTLCに供し、クロロフォルム／メタノール＝90：10で溶出させた。保護基のついたフルオレセニルビューロマイシン (Fluorpur) はシリカゲルTLCでクロロフォルム／メタノール＝90：10で溶出させた場合、 R_f 0.26の分画に溶出された。

溶出された保護基のついたFluorpurを濃アンモニア水／エタノール＝2：1の混合溶液1 mlに加え、 β -シアノエチル基を除去した。この反応によりFluorpurが7 mg得られた。合成物がFluorpurであることは、そのpH 9の溶液の紫外可視吸収スペクトルが272 nm (ビューロマイシン部由来) と494 nm (フルオレセイン部由来) に現れること、MALDI/TOF マススペクトロメトリで $[M+H]^+$ の分子イオンが m/z 1010 に現れることから同定された。

(3) C末端ラベル化タンパク質の作成

上記(1)で作成したmRNAはウサギ網状赤血球無細胞翻訳系 (Rabbit Reticulocyte Lysate Systems, Nuclease Treated: Promega 社製)、及び小麦胚芽無細胞翻訳系 (Wheat Germ Extract: Promega 社製) を用い、上記(2)で作成したFluorpurを最終濃度16 μ Mになるように加え、それぞれの至適反応温度 (ウサギ網状赤血球無細胞翻訳系：30℃、小麦胚芽無細胞翻訳系：25℃) で60分反応させた。

(4) タンパク質のラベル化の確認

上記(3)の各無細胞翻訳系反応液をSDS ポリアクリルアミド電気動 (SDS-PAGE) でSchaggerらの方法 (Schagger, H. and von Jagow, G., Anal. Biochem. 166, 368-379 (1987)) により20V定電圧にて90分電気泳動したゲルを蛍光イメージングアナライザー (FluorImager 595 :Molecular Dynamics 社製) で蛍光量を測定することにより行った。

最も効率よく蛍光ラベル化された β -ラクタマーゼタンパク質は、ストップコドン削除した β -ラクタマーゼ mRNA を用いて小麦胚芽無細胞翻訳系により作成したものであった。同様の系でストップコドンのある β -ラクタマーゼをコードする DNA から転写した RNA を用いた場合に加え、ラベル化効率は 10 倍以上であった。

またウサギ網状赤血球無細胞翻訳系においてもストップコドン削除した β -ラクタマーゼをコードする DNA から転写した RNA を用いた場合、ストップコドンのあるものよりもラベル化効率が 3~4 倍高かった。

実施例 2 蛍光偏光解消法を用いた C 末端ラベル化プロテイン A の一部 B ドメインとヒト Ig G との相互作用の解析

(1) B ドメインをコードする DNA 断片の構築とその mRNA の構築

転写効率の高い大腸菌ウイルス T 7 の RNA ポリメラーゼによって認識される DNA 配列 (T 7 プロモーター配列) と翻訳の際に真核細胞のリボソームによって認識されやすい配列 (K o z a k コンセンサス配列) と原核細胞のリボソームによって認識されやすい配列 (シャイン・ダルガーノ配列: Shine-Dalgarno) を有し、その下流にプロテイン A の B ドメインをコードした DNA 断片を、次のようにして構築した。

まず、T 7 プロモーター配列と K o z a k コンセンサス配列及びシャイン・ダルガーノ配列を有する領域と B ドメインをコードする配列を有する領域の DNA を独立して作成した。T 7 プロモーター配列 (Rosenberg, A.H., et al., Gene, 56, 125-135 (1987)) と K o z a k コンセンサス配列及びシャイン・ダルガーノ配列を含む 1 本鎖 DNA (配列番号 7) を有機合成し、DNA プライマー (配列番号 8) と B ドメインの一部をコードしたプライマー (配列番号 9) によってポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) を行った。DNA 合成酵素は、TaKaRaEx Taq Polymerase (宝酒造社製) を用いた。

一方、プロテイン A 遺伝子を載せた p R I T 2 T プラスミド (New England

Biolab.社製)を鋳型として配列番号8のアンチセンスプライマー(配列番号10)とDNAプライマー(配列番号11)を用いてポリメラーゼ連鎖反応を行うことにより、BドメインをコードするDNA領域を増幅した。これらの2つのPCR産物を重複伸長(Overlap extension)法(Horton R.M., et al., Gene 77, 61-68 (1989))に従って、結合させ、2つのDNAプライマー(配列番号8及び配列番号11)でPCRすることによりBドメインをコードするDNA断片を作成した。いずれのPCRにおいてもDNA合成酵素は、TaKaRaEx Taq Polymerase(宝酒造社製)を用いた。

上記した方法で作成したDNAを、反応液100 μ l 当たり10 μ g 加え、RNA合成キット Ribomax Large Scale RNA Production System (Promega 社製)を使って mRNA に転写した。翻訳効率を上げるためにキャップアナログ (RNA capping Analog; Gibco BRL 社製)を最終濃度が7.2 mMになるように加え、mRNAの5'側を修飾した。キャップアナログ及び過剰のNTP (ヌクロオチド3リン酸)を除去するために、プライマー除去剤 (Primer Remover: Edge Biosystems 社製)を使ってエタノール沈殿を行った。

(2) 蛍光ラベル化試薬 Fluorescein-puromycin (Fluorpur)の調製

ビューロマイシン (puromycin: Sigma 社製)、26 mg (48 μ mol)を3mlの乾燥ピリジンに溶かし、減圧下で蒸発させ、脱水させた。この操作を3回繰り返した。これに5mlの4% テトラゾール/ アセトニトリル溶液とフルオレダイト (6-N-carboxy-di-O-pivaloyl-fluorescein-hexyl-O-(2-cyanoethyl)-(N,N'-diisopropyl)-phosphoramidite: 日本パーセプティブ社製)を加え、室温で攪拌させた。反応はシリカゲルの薄層クロマトグラフィー (TLC、展開溶媒: クロロホルム: メタノール=9:1)でモニターした。通常、反応は2時間で終了する。反応後、溶媒を減圧下で追い出し、これに0.1Mのヨウ素をテトラヒドロフラン/ピリジン/水=80:40:2に溶かした溶液2mlを加え、室温で攪拌させながら生成したホスファイトートリエステルを酸化させた。

1時間半後、溶媒を減圧下で除去し、残部をクロロホルムで抽出した。抽出

液は無水硫酸マグネシウム存在下で乾燥させ、溶媒を除去した。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー（メルク社製）にかけ、クロロホルム/メタノール＝90：10で溶出させた。保護基のついた Fluorpur はシリカゲル TLC（展開溶媒：クロロホルム：メタノール＝9：1）で R_f 0.26 のところに溶出された。次に保護基の脱保護を行なった。

保護基のついた Fluorpur を濃アンモニア水/エタノール＝2：1の混合溶液 1 ml に加え、 β -シアノエチル基を除去すると Fluorpur が 7 mg 得られた。合成品が Fluorpur であることは、その pH 9 の溶液の紫外可視吸光スペクトルが 272 nm（ビューロマイシン部由来）と 494 nm（フルオレセイン部由来）に現れることならびに、MALDI/TOF マススペクトロメトリーで、分子イオンが m/z 1010 に現れることから同定された。

（３）Ｃ末端ラベル化タンパク質の作成

作成した mRNA は、無細胞翻訳キット E.coli S30 抽出物（Promega 社製）を用いた翻訳系において、フルオニルビューロマイシン(Fluorpur)の最終濃度が 16 mM になるように加え、37°Cで 60 分反応させた。未反応の Fluorpur を取り除くために、25 ml の TBS 緩衝液（10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0）で平衡化した PD-10 カラム（BIO-RAD 社製）で溶出した。最初の 1.6 ml のフラクションにラベル化された B ドメインが溶出した。電気泳動で確認するためには、さらに Centricon 3（アミコン社製）で遠心し、130 μ l 程度まで濃縮した。

（４）タンパク質のラベル化の確認

上記（３）の各無細胞翻訳系反応液を SDS ポリアクリルアミド電気動(SDS-PAGE)で Schagger らの方法(Schagger, H. and von Jagow, G., Anal Biochem., 166, 368-379 (1987))により 20 V 定電圧にて 90 分電気泳動したゲルを蛍光イメージングアナライザー (FluorImager 595 :Molecular Dynamics 社製)で蛍光量を測定することにより行った。

さらに、pH.9 の溶液中で 494 nm の吸光度から求めたフルオレセインを指標として、蛍光分光光度計（RF-502：島津社製）を使用してラベル化された B

ドメインタンパク質の濃度を測定した。

(5) 蛍光偏光解消測定装置によるBドメインとヒト IgG との相互作用の解析
ラベル化されたBドメインタンパク質濃度を 0.1 から 1 nM 程度にして、ヒト IgG (SIGMA 社製) を 10 段階に希釈することで、0.01 nM から 10 μ M の濃度のサンプルを作成し、これに加えた。30分、室温で静置した後、蛍光偏光解消測定装置 (BEACON2000, PanVera 社) によって、その偏光度を測定した。各ヒト IgG の濃度に対する偏光度の結果を第4図に示した。この測定値に基づき、解離定数をもとめた結果、 $KD=6.4 \times 10^{-8}$ であった。これは、既知のデータと良く一致した。

実施例3 ビオチン化タンパク質のストレプトアビジンメンブレンへの固定化

(1) GFPuv4 をコードするDNA断片の構築とその mRNA の構築

T7 プロモーター配列と Kozak コンセンサス配列及びシャイン・ダルガーノ配列を含む1本鎖DNAを鋳型として、プライマーDNA (配列番号8) と GFPuv4 の一部をコードしたプライマー (配列番号12) によってポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) を行った。DNA 合成酵素は、KOD Polymerase (東洋紡社製) を用いた。

一方、GFPuv4 (Ito, Y., et al., Biochem Biophys Res. Commun, 264(2), 556-60 (1999)) をコードするDNAを鋳型として配列番号12のアンチセンスプライマー (配列番号13) と GFP 遺伝子の 3' 末端プライマー (配列番号14) を用いてポリメラーゼ連鎖反応を行うことにより、GFPuv4 をコードした DNA 領域を増幅した。

これらの2つのPCR産物を重複伸長 (Overlap extension) 法 (Horton R.M., et al., Gene, 77, 61-68 (1989)) に従って結合させ、2つの DNA プライマー (配列番号8及び配列番号14) を用いて PCR を行うことにより T7 プロモーターの下流に GFPuv4 をコードする DNA が結合した DNA 鎖を作成した。いずれの PCR においても DNA 合成酵素は、KOD Polymerase (東洋紡社製) を用いた。

上記した方法で作成した DNA を、反応液 100 μ l 当たり 10 μ g 加え、RNA 合

成キット Ribomax Large Scale RNA Production System (Promega 社製) を使って mRNA に転写した。翻訳効率を上げるためにキャップアナログ (RNA capping Analog; Gibco BRL 社製) を最終濃度が 7.2 mM になるように加え、mRNA の 5' 側を修飾した。キャップアナログ及び過剰の NTP (ヌクロオチド 3 リン酸) を除去するために、プライマー除去剤 (Primer Remover: Edge Biosystems 社製) を使ってエタノール沈殿を行った。

(2) ビオチンラベル化試薬 Biotin-puromycin (Biotin-Puro) の調製

アミノ基と 5' 水酸基をそれぞれトリフルオロアセチル基とジメトキシトリチル基で保護したビューロマイシン (SIGMA 社製) を 3' 水酸基を介して固相担体 (NovasYn TG amino resin LL: Nova Biochem 社製) に結合させ、ホスホアミダイド法により、核酸合成機 (ABI 3498: Perkin Elmer 社製) 上で Biotin (Biotin TEG Phosphoramidite: グレンリサーチ社)、あるいは PEG スペーサー (Spacer 18: グレンリサーチ社製) を結合させた後に脱保護を行った。

(3) タンパク質のラベル化

作成した mRNA 2 μ g は、無細胞翻訳キット小麦胚芽抽出物 (Promega 社製) を用いた翻訳系において、500 μ M ビオチンビューロマイシン (Biotin-puro) 2 μ l、又は 500 μ M ポリエチレングリコールビューロマイシン (PEG-puro) 2 μ l をそれぞれ加え、26°C で 60 分反応させた。未反応の Biotin-puro 又は PEG-puro を取り除くために、25 ml の TBS 緩衝液 (10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0) で平衡化した PD-10 カラム (BIO-RAD 社製) で溶出した。

(4) タンパク質のラベル化の確認

ビオチンビューロマイシン (Biotin-puro) でラベル化されたタンパク質の確認は、上記のサンプルを各 15 μ l 取り、SAM2 Biotin Capture Membrane (Promega 社製) にスポットし、10 分間静置した後、このメンブレンを TBS 緩衝液 (10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0) で洗浄した。この TBS 緩衝液の洗浄の前及び後に、FluoroImagerFX (Bio-Rad 社製) を用いてメンブレン上の蛍光強度をイメージした。この結果を第 5 図に示す。TBS 緩衝液で洗浄する前は、Biotin-puro と

PEG-puro のそれぞれが同様の強度を示したが、洗浄後は PEG-puro でラベルされた GFPuv4 は洗い流されていた。一方 Biotin-puro によってラベル化された GFPuv4 はメンブレンにビオチンにより固定化された。

実施例4 蛍光イメージアナライザーを用いたビオチン化プロテインA、BドメインとヒトIgGとの相互作用の解析

(1) プロテインA、Bドメイン及び GFPuv4 をコードするDNA断片の構築とその mRNA の構築

T7 プロモーター配列と Kozak コンセンサス配列及びシャイン・ダルガーノ配列を含む1本差DNA(配列番号7)を鋳型としてプライマーDNA(配列番号8)とプロテインA、Bドメインの一部をコードした塩基配列及びリンカー配列(Gly-Gly-Gly-Gly-Ser をコードする塩基配列)を含むプライマー(配列番号15)によってポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を行った。DNA合成酵素は、KOD Polymerase(東洋紡社製)を用いた。

一方、GFPuv4 (Ito, Y., et al., Biochem Biophys Res. Commun, 264(2), 556-60 (1999)) をコードするDNAを鋳型として配列番号15のリンカー配列のアンチセンス配列及び GFPuv4 の一部をコードする塩基配列を含むプライマー(配列番号16)と GFP をコードするDNAの3'末端プライマー(配列番号14)を用いてポリメラーゼ連鎖反応を行うことにより、5'末端にリンカー配列が結合した GFPuv4 をコードするDNA領域を増幅した。

これらの2つのPCR産物を重複伸長(Overlap extension)法(Horton R.M., et al. Gene, 77, 61-68 (1989))に従って、結合させ、2つのDNAプライマー(配列番号8及び配列番号14)を用いてPCRを行うことによりT7プロモーターの下流にプロテインA、BドメインをコードするDNA、及びリンカー配列を介して GFPuv4 をコードするDNAが結合したDNA鎖を作成した。いずれのPCRにおいてもDNA合成酵素は、KOD Polymerase(東洋紡社製)を用いた。

上記した方法で作成したDNAを、反応液100 μ l 当たり10 μ g 加え、RNA合

成キット Ribomax Large Scale RNA Production System (Promega 社製) を使って mRNA に転写した。翻訳効率を上げるためにキャップアナログ (RNA capping Analog; Gibco BRL 社製) を最終濃度が 7.2 mM になるように加え、mRNA の 5' 側を修飾した。キャップアナログ及び過剰の NTP (ヌクロオチド 3-リン酸) を除去するために、プライマー除去剤 (Primer Remover: Edge Biosystems 社製) を使ってエタノール沈殿を行った。

(2) ビオチンラベル化試薬 Biotin-puromycin (Biotin-Puro) の調製

アミノ基と 5' 水酸基をそれぞれトリフルオロアセチル基とジメトキシトリチル基で保護したピューロマイシン (SIGMA 社製) を 3' 水酸基を介して固相担体 (NovasYn TG amino resin LL: Nova Biochem 社製) に結合させ、ホスホアミダイド法により、核酸合成機 (ABI 3498: Perkin Elmer 社製) 上で PEG スペース (Spacer Phosphoramidite 18: グレンリサーチ社製)、Biotin (Biotin TEG Phosphoramidite: グレンリサーチ社)、を順次結合させた後に脱保護を行った。

(3) タンパク質のラベル化

作成した mRNA 2 μ g は、無細胞翻訳キット小麦胚芽抽出物 (Promega 社製) を用いた翻訳系において、500 μ M ビオチンピューロマイシン (Biotin-puro) 2 μ l を加え、26 $^{\circ}$ C で 60 分反応させた。未反応の Biotin-puro を取り除くために、Bio-spin カラム (BIO-RAD 社製) でゲル濾過を行った。

(4) C末端ビオチンラベル化 Bドメイン-GFPuv4 結合タンパクの固定化

上記 (3) で作成した C末端ビオチンラベル化 Bドメイン-GFPuv4 結合タンパク (Biotin-DomainB-GFPuv4) を SAM2 Biotin Capture Plate (Promega 社製) 各ウェルに 50 μ l ずつ加え、15 分間静置した後、各ウェルを TBS 緩衝液 (10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 8.0) で洗浄した。次に Biotin と結合しなかったプレートに接着したストレプトアビジンをコートするために、1 mM Biotin/PBS 100 μ l を加えた。その後 200 μ l の TBS 緩衝液で 5 回ウェルを洗浄した。次に 1% BSA (SIGMA 社製) /PBS でブロッキングした。またコントロールとして Biotin-DomainB-GFPuv4 を固定化していないウェルも同様にブロッキングした。

(5) 蛍光イメージングアナライザーによる固相化Bドメインとヒト IgG との相互作用の解析

上記(4)で作成した Biotin-DomainB-GFPuv4 を固定化した、又は固定化していない SAM2 Biotin Capture Plate の各ウェルに、Bドメインと affinity の高い Monoclonal Anti-Human IgG I Biotin Conjugate(Mouse IgG2a isotype) (SIGMA 社製)あるいは、Bドメインと affinity の低い Biotin-Mouse Monoclonal Anti-Human IgA I(mouse IgG1 isotype)(SIGMA 社製)を PBS 緩衝液で 5 万倍に希釈したものを加え、1 時間静置した。この各ウェルを TBS 緩衝液で 3 回洗浄した後、ExtraAvidin-Alkaline Phosphatase(SIGMA 社製)を加え、10 分間静置後、TBS 緩衝液で 3 回洗浄した。さらに Attphos substrate(Amersham pharmacia biotech 社製)を加え、室温で 20 分反応させた。これを蛍光イメージングアナライザー (FluorImager FX:Bio-Rad 社製) を用いてイメージングした結果を第 6 図に示した。

Biotin-DomainB-GFPuv4 を固定化していないウェルにはバックグラウンドの蛍光しか観察されず、Biotin-DomainB-GFPuv4 を固定化した各ウェルにおいては、Bドメインと affinity の高い Mouse IgG2a isotype を投入したウェルにおける蛍光が、affinity の低い mouse IgG1 isotype を投入したウェルにおける蛍光より強くなっており、相互作用の強度を測定、解析することができた。

産業上の利用可能性

本発明により、現在急速に蓄積されている遺伝子の塩基配列がコードするタンパク質の機能解析、例えばタンパク質-タンパク質相互作用、タンパク質-核酸相互作用、タンパク質-低分子化合物相互作用等の解析を迅速化するための手段が提供される。また、本発明により、タンパク質の機能解析において不可欠である大量のデータを迅速に解析する方法(ハイスループット化)において有力な手段が提供される。

請求の範囲

1. タンパク質-分子間相互作用の解析方法であって、下記の工程：
 - (1) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び
 - (2) 該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号において、該C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づいて発せられる信号の変化を検出する工程を含む方法。
2. 標的分子がタンパク質、核酸、糖鎖、又は低分子化合物である請求の範囲第1項に記載の方法。
3. 標的分子が標識物質によりラベル化されているラベル化分子である請求の範囲第1項又は第2項に記載の方法。
4. 標識物質が蛍光標識試薬である請求の範囲第3項に記載の方法。
5. C末端ラベル化タンパク質が、標識物質を含むラベル部とタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物を含むアクセプター部とを含むラベル化試薬の存在下で、該タンパク質のコーディング領域を含む核酸を転写及び／又は翻訳系で発現させてタンパク質合成を行わせることにより調製されたものである請求の範囲第1項ないし第4項のいずれか1項に記載の方法。
6. アクセプター部がピューロマイシン、3'-N-アミノアシルピューロマイシンアミノヌクレオシド、3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドの化学構造骨格を含む化合物又はそれらの類縁体を含む請求の範囲第5項に記載の方法。
7. ラベル化試薬がラベル部とアクセプター部とがスパーサーを介して結合している化合物を含む請求の範囲第5項又は第6項に記載の方法。
8. C末端ラベル化タンパク質又は標的分子のいずれか一方が固相に結合している請求の範囲第1項ないし第7項のいずれか1項に記載の方法。
9. C末端ラベル化タンパク質が、該タンパク質を構成するラベル部又はラベル部以外の部分により固相に結合している請求の範囲第8項に記載の方法。

10. C末端ラベル化タンパク質を構成するラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子を含み、該分子が固相表面に結合している特定のポリペプチドとの連結を介して固相に結合する請求の範囲第9項に記載の方法。

11. 特定のポリペプチドとそれに特異的に結合する能力を有する分子の組み合わせが、ビオチン結合タンパク質／ビオチン、マルトース結合タンパク質／マルトース、Gタンパク質／グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド／金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ／グルタチオン、DNA結合タンパク質／DNA、抗体／抗原分子、カルモジュリン／カルモジュリン結合ペプチド、ATP結合タンパク質／ATP、及びエストラジオール受容体タンパク質／エストラジオールよりなる群から選ばれるいずれかの組み合わせである請求の範囲第10項に記載の方法。

12. 信号の変化の測定を表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、固相酵素免疫検定法、蛍光偏光解消法、及び蛍光相関分光法よりなる群から選択される1以上の方法により行う請求の範囲第1項ないし第11項のいずれか1項に記載の方法。

13. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部により固相に結合されており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化されたラベル化分子であり、信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素免疫検定法よりなる群から選択される1以上の方法により行われる請求の範囲第1項、第2項、第5項ないし第11項のいずれか1項に記載の方法。

14. ラベル化分子が蛍光標識試薬によりラベル化された標的分子である請求の範囲第13項に記載の方法。

15. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部以外の部分により固相に結合されており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化されたラベル分子であり、信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素

免疫検定法よりなる群から選択される 1 以上の方法により行われる請求の範囲第 1 項、第 2 項、第 5 項ないし第 11 項のいずれか 1 項に記載の方法。

16. ラベル化分子が蛍光標識試薬によりラベル化された標的分子である請求の範囲第 15 項に記載の方法。

17. 標的分子が固相に結合されており、C 末端ラベル化タンパク質のラベル部より発せられる信号の変化の測定が表面プラズモン共鳴法、エバネッセント場イメージング法、蛍光イメージングアナライズ法、及び固相酵素免疫検定法よりなる群から選択される 1 以上の方法により行われる請求の範囲第 1 項、第 2 項、第 5 項ないし第 11 項のいずれか 1 項に記載の方法。

18. C 末端ラベル化タンパク質及び標的分子が固相に結合されずに溶液中に存在しており、標的分子が非ラベル化分子又は標識物質によりラベル化されたラベル化分子であり、信号の変化の測定が蛍光偏光解消法及び／又は蛍光相関分光法により行われる、請求の範囲第 1 項、第 2 項、第 5 項ないし第 11 項のいずれか 1 項に記載の方法。

19. ラベル部とアクセプター部とを含むタンパク質のラベル化試薬であって、該ラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子であり、該アクセプター部がタンパク質の C 末端に結合する能力を有する化合物であるタンパク質のラベル化試薬。

20. ラベル部がスペーサーを介してアクセプター部に共有結合している請求の範囲第 19 項に記載の試薬。

21. スペーサーがポリエチレン又はポリエチレングリコールのいずれかである請求の範囲第 19 項又は第 20 項に記載の試薬。

22. ラベル部がビオチン、マルトース、グアニンヌクレオチド、金属イオン、グルタチオン、タンパク質結合性 DNA、抗原分子、カルモジュリン結合ペプチド、ATP、及びエストラジオールよりなる群より選ばれる 1 以上の分子を含む請求の範囲第 19 項ないし第 21 項のいずれか 1 項に記載の試薬。

23. アクセプター部がピユーロマイシン、3'-N-アミノアシルピユーロマイシ

ンアミノヌクレオシド、又は3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドのいずれかの化学構造骨格を含む化合物又はそれらの類縁体を含む請求の範囲第19項ないし第22項のいずれか1項に記載の試薬。

24. C末端ラベル化タンパク質が該タンパク質を構成するラベル部により固相に結合していることを特徴とする固定化タンパク質。

25. C末端ラベル化タンパク質が、標識物質よりなるラベル部とタンパク質のC末端に結合する能力を有する化合物よりなるアクセプター部とから構成されるラベル化試薬の存在下で、該タンパク質のコーディング領域を含む核酸を転写及び／又は翻訳系で発現させてタンパク質合成を行わせることにより調製されたものである請求の範囲第24項に記載の固定化タンパク質。

26. ラベル化試薬のラベル部がスペーサーを介してアクセプター部に共有結合している請求の範囲第24項又は第25項に記載の固定化タンパク質。

27. ラベル部が特定のポリペプチドと特異的に結合する能力を有する分子であり、該分子が固相に結合された特定のポリペプチドと結合する請求の範囲第24項ないし第26項のいずれか1項に記載の固定化タンパク質。

28. アクセプター部がビューロマイシン、3'-N-アミノアシルビューロマイシンアミノヌクレオシド、又は3'-N-アミノアシルアデノシンアミノヌクレオシドのいずれかの化学構造骨格を有する化合物又はその類縁体を含む請求の範囲第24項ないし第28項のいずれか1項に記載の固定化タンパク質。

29. ラベル部を構成する特定の分子と該分子と特異的に結合する能力を有する分子の組み合わせが、ビオチン結合タンパク質／ビオチン、マルトース結合タンパク質／マルトース、Gタンパク質／グアニンヌクレオチド、ポリヒスチジンペプチド／金属イオン、グルタチオン-S-トランスフェラーゼ／グルタチオン、DNA結合タンパク質／DNA、抗体／抗原分子、カルモジュリン／カルモジュリン結合ペプチド、ATP結合タンパク質／ATP、及びエストラジオール受容体タンパク質／エストラジオールよりなる群より選ばれるいずれかの組み合わせである請求の範囲第24項ないし第28項のいずれか1項に記載のタンパク質。

30. 請求の範囲第24項ないし第29項のいずれか1項に記載の固定化タンパク質の集合体を含むプロテインチップ。

31. アダプタータンパク質が表面に結合した基盤を保持する手段、該基盤にC末端ラベル化タンパク質を導入する手段、及び該基盤を洗浄する手段を有する請求の範囲第30項に記載のプロテインチップを作成するための装置。

32. チップを保持する手段、該チップに標的分子を接着させる手段、該チップを洗浄する手段、及び該C末端ラベル化タンパク質からの信号を測定し、該C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づく信号の変化を検出するための手段を有する、請求の範囲第10項、第11項、第13項、又は第14項のいずれか1項に記載の方法において多数の検体の同時解析を行うための装置。

33. タンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、下記の工程：

(1) タンパク質のC末端をラベル化してC末端ラベル化タンパク質を製造する工程；

(2) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(3) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には該タンパク質と該標的分子が相互作用すると判定する工程を含む方法。

34. さらに下記工程：

(4) 相互作用すると判定されたタンパク質及び標的分子を同定する工程を含む請求の範囲第33項に記載の方法。

35. タンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、下記の工程：

(1) 該タンパク質を含むC末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(2) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C

末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には、該C末端ラベル化タンパク質と該標的分子とが相互作用すると判定する工程を含む方法。

36. さらに下記工程：

(3)相互作用すると判定されたタンパク質及び標的分子を同定する工程を含む請求の範囲第35項に記載の方法。

37. タンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質のスクリーニング方法であって、下記の工程：

(1)該タンパク質を含むC末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び

(2)C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じた該C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合にはその標的分子が該タンパク質と相互作用すると判定する工程を含む方法。

38. 請求の範囲第37項でスクリーニングされた、上記タンパク質と相互作用する分子又は上記分子と相互作用するタンパク質。





39. 請求の範囲第33項ないし第36項のいずれか1項に記載の方法に使用するためのC末端ラベル化タンパク質。

40. 請求の範囲第37項に記載の方法に使用するためのC末端ラベル化タンパク質。


要 約 書

タンパク質-分子間相互作用の解析方法であって、下記の工程：(1) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び(2) 該 C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号において、該 C末端ラベル化タンパク質と標的分子との相互作用に基づいて発せられる信号の変化を検出する工程を含む方法、並びにタンパク質と相互作用する分子又は分子と相互作用するタンパク質の同定方法であって、下記の工程：(1) タンパク質の C末端をラベル化して C末端ラベル化タンパク質を製造する工程；(2) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させる工程；及び(3) C末端ラベル化タンパク質と標的分子とを接触させることにより生じる該 C末端ラベル化タンパク質又は該標的分子が発する信号の変化を検出した場合には該タンパク質と該標的分子が相互作用すると判定する工程を含む方法。


第 1 図



第2図




Fluorpur (I)




Fluorthiopur (II)

第3図



第4図




第5図

ビオチン化GFP


ビオチン化されていないGFP

洗浄前

洗浄後



第 6 図



SEQUENCE LISTING

<110> Mitsubishi Chemical Corporation

<120> A method of analyzing protein-molecule interaction

<130> A01369M

<150> JP P1999-244704

<151> 1999-08-31

<160> 16

<210> 1

<211> 88

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 1

gatcccgcgga aattaatacg actcactata gggagaccac aacgggtttcc ctctagaaat 60

aattttgttt aactttaaga aggagatg 88

<210> 2

<211> 33

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 2

gatcccgcgga aattaatacg actcactata ggg 33

<210> 3

<211> 29

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> misc_feature

<222> (6)

<223> n is ribocytidylic acid.

<400> 3

ggaagncatg gtggcatctc ctctttaa

29

<210> 4

<211> 29

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<221> misc_feature

<222> (6)

<223> n is ribocytidylic acid.

<400> 4

gcttcnaaac aaagcactat tgcactggc

29

<210> 5

<211> 30

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 5

ccaatgctta atcagtgagg cacctatctc

30

<210> 6

<211> 32

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 6

ggtctgacag ttaccaatgc ttaatcagtg ag

32

<210> 7

<211> 117

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 7

gatcccgcca aattaatag actcactata gggagaccac aacggtttcc ctctagaaat 60

aattttgttt aactttaaga aggagatgcc accatgggtg agccccgcat ggagtgc 117

<210> 8

<211> 31

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 8

ggccccgcca aattaatag actcactata g

31

<210> 9

<211> 40

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 9

tgttgaattt gttatccatg gtggcatctc cttcttaaag

40

<210> 10

<211> 25

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 10

ctttaagaag gagatgccac catgg

25

<210> 11

<211> 31

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 11

gttgaattcg ttgtcagctt ttggtgcttg a 31

<210> 12

<211> 31

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 12

gttgaattcg ttgtcagctt ttggcgcttg a

31

<210> 13

<211> 31

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 13

gttgaattcg ttgtcagctt ttggcgcttg a

31

<210> 14

<211> 32

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 14

ttttagagc tcatccatgc catgtgtaat cc

32

<210> 15

<211> 39

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 15

agatccgccg ccaccgttga atttggtgtc agcttttgg

39

<210> 16

<211> 40

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence:synthetic

<400> 16

ggtagcgcg gatctatgag taaaggagaa gaactttca

40

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 A01369M	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP00/05920	国際出願日 (日.月.年) 31.08.00	優先日 (日.月.年) 31.08.99	
出願人(氏名又は名称) 三菱化学株式会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 3 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☒ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ G01N33/566, 33/532, C12N15/09, C07K17/00, 1/13
C12Q1/00, 1/68

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ G01N33/566, 33/532, C12N15/09, C07K17/00, 1/13
C12Q1/00, 1/68

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2000年
日本国登録実用新案公報	1994-2000年
日本国実用新案登録公報	1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

BIOSIS, JOIS

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	柳川弘志 「第20回日本分子生物学会年会 プログラム・講演要 旨集」 1997年 第546頁 3-501-P-505	1~40
Y	JP, 2-10159, A (ベーリンガー・マンハイム・ゲゼルシ ャフト・ミット・ベシュレンクレル・ハフツング) 12. 1月. 1990 (12. 01. 90) &EP, 331126, A	1~18 33~40

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 11. 00

国際調査報告の発送日

05.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

亀田 宏之

2J

9015

電話番号 03-3581-1101 内線 3252

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	J P, 3-103765, A (東洋紡績株式会社) 30. 4月. 1991 (30. 04. 91) (ファミリーなし)	1~18 33~40
Y	J P, 10-248599, A (理化学研究所) 22. 9月. 1998 (22. 09. 98) (ファミリーなし)	19~32
Y	J P, 11-94747, A (日立ソフトウェアエンジニアリング 株式会社) 9. 4月. 1999 (09. 04. 99) (ファミリーなし)	19~32
Y	J P, 8-188540, A (西川武二) 23. 7月. 1996 (23. 07. 96) (ファミリーなし)	1~40

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05920

PCT/JP00/05920

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ G01N33/566, 33/532, C12N15/09, C07K17/00, 1/13
C12Q1/00, 1/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G01N33/566, 33/532, C12N15/09, C07K17/00, 1/13
C12Q1/00, 1/68

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

BIOSIS, JOIS

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Hiroshi YANAGAWA, "Program and Abstracts of the 20 th Annual Meeting in 1997, Nippon Bunshi Seibutsu Gakkai," page 546, 3-501-P-505	1-40
Y	JP, 2-10159, A (Boehringer Mannheim GmbH), 12 January, 1990 (12.01.90) & EP, 331126, A	1-18 33-40
Y	JP, 3-103765, A (Toyobo Co., Ltd.), 30 April, 1991 (30.04.91) (Family: none)	1-18 33-40
Y	JP, 10-248599, A (RIKAGAKU KENKYUSHO), 22 September, 1998 (22.09.98) (Family: none)	19-32
Y	JP, 11-94747, A (Hitachi Software Eng. Co., Ltd.), 09 April, 1999 (09.04.99) (Family: none)	19-32
Y	JP, 8-188540, A (Takeji NISHIKAWA), 23 July, 1996 (23.07.96) (Family: none)	1-40

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24 November, 2000 (24.11.00)

Date of mailing of the international search report
05 December, 2000 (05.12.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.